

Cenny owoc
wymaga
finalnego
kroku



FMC



Zadbaj
o #cennyowoc

Exirel[®]

Ochrona przed szkodnikami

powered by

CYAZYPYR[®]

active ingredient



Dowiedz się więcej: www.exirel.pl

JAK PRODUCENCI CZEREŚNI I WIŚNI MOGĄ LEPIEJ KONTROLOWAĆ SWOJE ZYSKI?

Zadbaj o #cennyowoc
Więcej informacji na
www.cennyowoc.pl



EXIREL® – CENNY OWOC WYMAGA FINALNEGO KROKU

Nasionnica trześniówka (*Rhagoletis cerasi*)



Muszka plamoskrzydła (*Drosophila suzukii*)



EXIREL® - INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA W OCHRONIE CZEREŚNI I WIŚNI PRZED MUSZKĄ PLAMOSKRZYDŁĄ I NASIONNICĄ TRZEŚNIÓWKĄ.

Substancja czynna	Cyazypyr® (cyjanotraniliprol)
Grupa IRAC	28
Grupa toksyczności	H315, H317, H410
Czas aplikacji	BBCH 79-87
Dawka substancji na ha	750 ml/ha (maksymalne stężenie środka 75 ml/hL)
Ilość wody	1000-1300 l/ha*
Liczba aplikacji	1 lub 2
Czas pomiędzy aplikacjami	10 dni

■ ZALECENIA STOSOWANIA EXIREL® W UPRAWACH CZEREŚNI I WIŚNI




BBCH 70-87 (maj do sierpień)

W celu ochrony czereśni i wiśni przed muszką plamoskrzydłą i nasionnicą trześniówką stosować od fazy osiągnięcia przez owoce około 90% wielkości do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 79-87). Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, w czasie składania jaj oraz wylęgu pierwszych larw.

UWAGA! Exirel® ze względu na sposób i długość działania (do 3 tygodni) musi być stosowany na podstawie monitoringu szkodników.

WYNIKI BADAŃ

**Zwalczanie *Drosophila suzukii*
na czereśniach produktem Exirel®
(10-15 dni po 2 aplikacjach)**



źródło badania: Włochy lata 2012-2014

Exirel® wyjątkowo skutecznie zwalcza *Drosophila suzukii*, na poziomie porównywalnym do istniejących, ale wycofanych z rynku produktów. Karencja 7 dni (dla winorośli 10 dni) pozwala na pełną elastyczność w stosowaniu produktu.

Średnia ilość uszkodzeń bez ochrony to 38% owoców.

DLA OPTYMALNEGO ZWALCZENIA DROSOPHILA SUZUKII PRODUKT EXIREL® MUSI BYĆ ZASTOSOWANY Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA PLANTACJI

Do monitoringu muszki plamoskrzydłej wykorzystuje się profesjonalne pułapki monitorujące z płynem wabiącym owady. Pułapki należy rozwiesić na drzewach czereśniowych i wiśniowych na wysokości ok. 1,5 metra, najpóźniej 30 dni przed wybarwianiem się owoców. Ważne jest, aby kontrolować je minimum 2 razy w tygodniu po to, żeby zaplanować zabieg zwalczania muchówek w odpowiednim czasie, czyli w chwili pojawienia się pierwszych szkodników, zanim zaczną one żerować na owocach, przed złożeniem jaj. Po odłowieniu się pierwszych muchówek w pułapkach należy prowadzić działania ograniczające populację szkodnika: masowe odłowory, usuwanie uszkodzonych owoców, wcześniejszy zbiór, a także zabiegi nowoczesnymi środkami ochrony roślin takimi, jak Exirel®.



ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

■ CECHY PRODUKTU

- Doskonała skuteczność w walce z muszkami owocowymi
- Natychmiastowe wstrzymanie żerowania form dorosłych i profilaktyka na 2-3 tygodnie, przed rozwojem larw
- Silne działanie zabezpieczające przed kolejnymi nalotami (z innych sadów)
- Wpływa na wylęgające się larwy z jaj, ograniczając rozrastanie się populacji nawet jeśli jest zastosowany na złożone jaja – dodatkowa redukcja populacji
- Tylko 7 dni karencji (10 dni dla winorośli)
- Wysoka selektywność wobec organizmów pożytecznych

■ KORZYŚCI ZE STOSOWANIA

- Możliwość zwalczenia także nowego szkodnika w Polsce – **muszki plamoskrzydłej (*Drosophila suzukii*)** oraz znanej **nasionnicy trześniówki**
- Wykorzystanie zabiegu na różnie dojrzewające w czasie odmiany
- Zabezpieczenie od nalotów z sadów niechronionych
- Czysty, zdrowy owoc to #cennyowoc – łatwiejszy zbiór i sprzedaż, a zatem wyższy zysk
- Możliwość użycia prawie do momentu zbioru i pewność co do wysokiej jakości zachowanego owocu, bez pozostałości biologicznych i chemicznych
- Można stosować z biologiczną ochroną

ZAKRES REJESTRACJI ŚRODKA EXIREL® W POLSCE

Rodzaj upraw	Zwalczane szkodniki
Jabłoń, grusza	owocówka jabłkóweczka, zwójki liściowe
Wiśnia, czereśnia	zwójki liściowe



STOSOWANIE ŚRODKA W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Rodzaj upraw	Zwalczane szkodniki
Grusza	zwójka siatkóweczka
Śliwa	owocówka śliwkóweczka, zwójki liściowe, (w tym zwójka siatkóweczka), owocnica żółtoroga
Wiśnia, czereśnia	nasionnica trześniówka, muszka plamoskrzydła (<i>Drosophila suzukii</i>)
Winorośl	zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka, muszka plamoskrzydła (<i>Drosophila suzukii</i>), skoczek winoroślowy

Nasi przedstawiciele

Zachód

Jakub Bednarczyk – Kierownik regionu

604 752 458 jakub.bednarczyk@fmc.com

Katarzyna Pośpiech **882 434 314**

katarzyna.pospiech@fmc.com

Katarzyna Stasilewicz **538 810 697**

katarzyna.stasilewicz@fmc.com

Południe

Adam Chrzanowski – Kierownik regionu

604 118 582 adam.chrzanowski@fmc.com

Radosław Bończak **538 810 689**

radoslaw.bonczak@fmc.com

Grzegorz Chmielniak **660 618 732**

grzegorz.chmielniak@fmc.com

Wschód

Krzysztof Witkowski – Kierownik regionu

735 207 213 krzysztof.witkowski@fmc.com

Marek Jackowski **538 810 703**

marek.jackowski@fmc.com

Leszek Konior **532 510 444**

leszek.konior@fmc.com



FMC Agro Polska Sp. z o.o.

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

tel. +48 22 397 17 86, www.fmcagro.pl