

The FMC logo is displayed in a white rectangular box in the upper right corner. It features the letters 'FMC' in a bold, red, sans-serif font, with a red cross-like symbol to the left of the 'F'.

FMC

The product name 'Stallion® 363 CS' is written in white, bold, sans-serif font on a dark green background. A white square is positioned to the left of the text.

Stallion® 363 CS

Ochrona przed chwastami

Daje pole do popisu

PRZEDWSCHODOWY HERBICYD DO OCHRONY GROCHU, BOBIKU, ZIEMNIAKÓW, MARCHWI I SELERA KORZENIOWEGO PRZED CHWASTAMI JEDNO- I DWULIŚCIENNYMI

- Wysoka skuteczność dzięki dwóm sprawdzonym substancjom czynnym
- Zapobieganie powstawaniu odporności
- Opatentowana technologia SYNCTEC®
- Pierwsze łączne kapsułkowanie
- Mniej zanieczyszczeń w opryskiwaczu i opakowaniach

STALLION® 363 CS ZAWIERA DWIE SUBSTANCJE CZYNNIE O UZUPEŁNIAJĄCYM SIĘ MECHANIZMIE DZIAŁANIA.

- Chlomezon jest absorbowany przez korzenie i część podziemną roślin, hamuje w roślinach syntezę barwników (chlorofilu i karotenoidów).
 - Pendimetalina jest pobierana przez korzenie i części nadziemne, hamuje procesy podziału komórek i wzrostu roślin.
- Łączne kapsułkowanie obu składników w opatentowanej technologii SYNCTEC®, zapewnia ich optymalne uwalnianie do gleby. Rośliny wrażliwe bieleją i zamierają. Środek niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy pierwszych liści.

CHWASTY WRAŻLIWE:

chwastnica jednostronna,
dymnica pospolita,
fiołek polny,
gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa,
jasnota różowa,

komosa biała,
niezapominajka polna,
perz właściwy,
psianka czarna,
przetacznik bluszczokowy,
pokrzywa żegawka,

przytulia czepna,
rdest powojowy (rdestówka powojowata),
rdest ptasi,
rumianek pospolity,
szarłat szorstki,
tasznik pospolity, tobołki polne,
wiechlina roczna.

ZALECENIA STOSOWANIA:

Roślina uprawna:

ziemniak

Termin stosowania:

Wykonać po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola, przed wejściem ziemniaków – najpóźniej na 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka. Nie wykonywać zabiegu po wschodach lub na liście.

Roślina uprawna:

groch jadalny, bobik

Termin stosowania:

Groch wysiewać na głębokość co najmniej 25 mm, w odleżałą glebę. Środek stosować bezpośrednio po siewie, na wilgotną, starannie uprawioną glebę bez grud i nierówności. Nie stosować, gdy kiełek znajduje się bliżej niż 13 mm od powierzchni. Nie stosować, gdy gleba jest przesuszona.

ZALECENIA STOSOWANIA:

Roślina uprawna:

marchew, seler korzeniowy*

Termin stosowania:

Bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną glebę bez grud i nierówności.

Zalecana dawka:

3,0 l/ha

*rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Stallion® jest znakiem towarowym FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

Nasi przedstawiciele

Zachód

Jakub Bednarczyk – Kierownik regionu

604 752 458 jakub.bednarczyk@fmc.com

Katarzyna Pośpiech 882 434 314

katarzyna.pospiech@fmc.com

Katarzyna Stasilewicz 538 810 697

katarzyna.stasilewicz@fmc.com

Południe

Adam Chrzanowski – Kierownik regionu

604 118 582 adam.chrzanowski@fmc.com

Radosław Bończak 538 810 689

radoslaw.bonczak@fmc.com

Grzegorz Chmielniak 660 618 732

grzegorz.chmielniak@fmc.com

Wschód

Krzysztof Witkowski – Kierownik regionu

735 207 213 krzysztof.witkowski@fmc.com

Marek Jackowski 538 810 703

marek.jackowski@fmc.com

Leszek Konior 532 510 444

leszek.konior@fmc.com



FMC Agro Polska Sp. z o.o.

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

tel. +48 22 397 17 86, www.fmcagro.pl