

Wartość
budowana



FMC

od Pierwszego
Dnia

Verimark®

Ochrona przed szkodnikami

powered by

CYAZYPYR®

active ingredient



Dowiedz się więcej: www.verimark.pl

Kwieciak malinowiec (*Anthonomus rubi*) – chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych, główny szkodnik upraw truskawki i malin w Europie. Szkodniki stanowią zagrożenie dla plantacji truskawek już od kwietnia. Samice składają jaja wewnątrz pąków kwiatowych (jedna samica może złożyć ich około 60). Pąki kwiatostanów, nadgryzione przez samice, wędzną i obumierają. Jaja są owalne, gładkie, białe, lekko błyszczące. Rozwijają się z nich larwy o długości ok. 3 mm o zakrzywionym ciele z brązową głową. Rozwój od jaja do osobnika dorosłego zajmuje około 5 tygodni. Osobniki dorosłe mają ok. 4 mm długości i pokryte są ciemnymi łuskami. Chrząszcze ukrywają się w roślinach lub glebie, gdzie zimują. Szkodliwość kwieciaka jest duża lub bardzo duża, w zależności od presji szkodnika. Uszkodzenie zaledwie 10-15% pąków znacznie zmniejsza plon handlowy. W niektórych przypadkach chrząszcze mogą doprowadzić do spadku plonu o 80%. Dlatego zwalczanie kwieciaka malinowca konieczne jest na wszystkich plantacjach produkcyjnych.



Lustrację roślin trzeba rozpocząć na początku kwitnienia truskawki poprzez odławianie chrząszczy do specjalnych pułapek z płynem wabiącym lub strząsanie chrząszczy z 200 losowo wybranych kwiatostanów na jasną płytkę. Próg zagrożenia to 2 chrząszcze wykryte podczas strząsania 200 kwiatostanów na 1-2 tygodnie przed lub na początku kwitnienia truskawki.


PROFIL PRODUKTU W UPRAWACH TRUSKAWKI

Substancja czynna	Cyazypyr® – cyjanotraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidów) – 200 g/l (18,66 %)
Formulacja	koncentrat do rozcieńczania wodą (SC)
Grupa IRAC	28
Zarejestrowany szkodnik	kwieciak malinowiec
Dawka stosowana	375 ml/ha
Liczba zabiegów	maksymalnie 2 zabiegi w sezonie (odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni)
Termin stosowania	od fazy dwóch liści do fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH 12-89), zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, najlepiej w czasie składania jaj
Uwagi	środek przeznaczony do stosowania w systemach nawadniania kropelkowego w czasie pierwszej 1/3 cyklu irygacyjnego, końcówka nawadniająca powinna znajdować się w pobliżu korzeni rośliny

ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

KIEDY STOSOWAĆ VERIMARK®

Karencja:
tylko 1 dzień!



Verimark® 375 ml/ha

Stosowanie przez system nawadniający do korzeni



Zadbaj już dziś o cenny owoc.
Zdrowy, czysty owoc to cenny owoc.
Nie tylko łatwiej go sprzedać, ale także
możesz osiągnąć na jego sprzedaży
wyższy zysk.

Verimark® i Cyazypyr® są znakami towarowymi
FMC Corporation lub podmiotów stowarzyszonych.

CYAZYPYR®

**To druga substancja z grupy diamidów z FMC
i pierwsza do kontroli szerokiego spektrum
szkodników zarówno gryzących, jak i ssących**



Mączliki



Miniarki




Muchówki



Chrząszcze



Ryjkowce




Skoczki



Motyle



Wciornastki



Mszyce

Nasi przedstawiciele

Zachód

Jakub Bednarczyk – Kierownik regionu

604 752 458 jakub.bednarczyk@fmc.com

Katarzyna Pośpiech 882 434 314

katarzyna.pospiech@fmc.com

Katarzyna Stasilewicz 538 810 697

katarzyna.stasilewicz@fmc.com

Południe

Adam Chrzanowski – Kierownik regionu

604 118 582 adam.chrzanowski@fmc.com

Radosław Bończak 538 810 689

radoslaw.bonczak@fmc.com

Grzegorz Chmielniak 660 618 732

grzegorz.chmielniak@fmc.com

Wschód

Krzysztof Witkowski – Kierownik regionu

735 207 213 krzysztof.witkowski@fmc.com

Marek Jackowski 538 810 703

marek.jackowski@fmc.com

Leszek Konior 532 510 444

leszek.konior@fmc.com



FMC Agro Polska Sp. z o.o.

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

tel. +48 22 397 17 86, www.fmcagro.pl