

The FMC logo is displayed in red on a white rectangular background in the top right corner. The letters 'F', 'M', and 'C' are bold and sans-serif, with a stylized horizontal bar through the 'F'.

FMC

The product name 'Foxtrot 069 EW' is written in white, bold, sans-serif font on a dark green background. A small white square is positioned to the left of the text.

Foxtrot[®] 069 EW

Ochrona przed chwastami

Miotłę wymiata

WIOSENNA LIKWIDACJA CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH W UPRAWACH ZBÓŻ, NAWET W ICH PÓŹNIEJSZYCH FAZACH ROZWOJOWYCH.

- Szybkie hamowanie wzrostu chwastów
- Bezpieczeństwo rośliny uprawnej
- Elastyczny zakres terminów stosowania i dawek

Foxtrot® 069 EW jest środkiem działającym systemicznie, pobieranym przez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, tj. do stożków wzrostu pędów i korzeni.

- 1–3 dni po zabiegu wzrost chwastów ulega zahamowaniu.
- 7–14 dni po zabiegu pojawiają się przebarwienia liści.
- 10–20 dni po zabiegu chlorozy zamieniają się w nekrozy.
- Następuje dalsze zamieranie tkanek.
- W zależności od warunków pogodowych, pełne zniszczenie rośliny trwa 10–30 dni.

POSIADA REJESTRACJĘ DO ZWALCZANIA:

- miotły zbożowej
- owsa głuchego
- chwastnicy jednostronnej

Foxtrot® jest znakiem towarowym FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA:

Gatunki zbóż	
Pszenica ozima, pszenżyto ozime	Jęczmień jary, pszenica jara
Termin stosowania	
Wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia	W fazie krzewienia, najpóźniej do początku fazy strzelania w źdźbło
Dawki stosowania	
1,0–1,2 l/ha	0,8–1,0 l/ha
Stosując łącznie z adiuwantem w dawce:	
Foxtrot® 069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1,0 l/ha	
Łączne stosowanie z produktem na chwasty dwuliścienne:	
Foxtrot® 069 EW 1,0–1,2 l/ha + Nuance 75 WG 20 g/ha	

- Niższe dawki produktu można stosować przy zabiegach solo i przy wsparciu adiuwanta
- Przy łącznym stosowaniu produktu z innym herbicydem, warto stosować wyższe dawki.
- Wyższą dawkę stosować do zwalczania chwastów znajdujących się w późniejszej fazie rozwojowej oraz w warunkach niesprzyjających wegetacji (np. w niskiej temperaturze, podczas suszy).
- Niższą dawkę stosować do zwalczania chwastów we wcześniejszych fazach rozwojowych (przed rozpoczęciem fazy krzewienia).

ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.