

FMC

NOWE ROZWIĄZANIE DO OCHRONY POWSCHODOWEJ SŁONECZNIKA




Express[®] SX[®]

Ochrona przed chwastami

■ WYJĄTKOWA TECHNOLOGIA KONTROLI CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH, KTÓRA MAKSYMALIZUJE BEZPIECZNY WZROST SŁONECZNIKA

Aktualnie jedyny herbicyd na rynku pozwalający na powschodowe zwalczanie chwastów dwuliściennych w słoneczniku. Wymaga jednak odpowiednich odmian słonecznika przystosowanych do jego aplikacji. Obecnie takie odmiany są dostępne u większości dostawców nasion.



FMC, logo FMC, Express® i SX® są zastrzeżonymi znakami towarowymi FMC Corporation lub podmiotów stowarzyszonych.

DOSKONALE NADAJE SIĘ DO UZUPEŁNIENIA WCZEŚNIEJSZYCH ZABIEGÓW PRZEDWSCHODOWYCH LUB JAKO ZABIEG POPRAWKOWY


- Działa niezależnie od wilgotności gleby
- Zwalcza szerokie spektrum chwastów dwuliściennych
- Elastyczny w doborze dawki i terminu stosowania
- Bezpieczny dla tolerancyjnych odmian słonecznika dzięki pozbawionej zanieczyszczeń formulacji



ROZWIĄZANIE PROBLEMU CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH W UPRAWACH SŁONECZNIKA

Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulica czepna, rdest powojowy



Komosa biała



Rumian polny



Rdest plamisty



Samosiewy rzepaku

ZALECENIA STOSOWANIA

Rodzaj upraw	słonecznik zwyczajny* – odmiany tolerancyjne na tribenuron metylowy
ZABIEG JEDNORAZOWY	
Zalecana dawka	45 – 60 g/ha środka + adiuwant Trend® 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody) Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej
Termin stosowania	do fazy 8 liści słonecznika (BBCH ≤ 18)
ZABIEG W SYSTEMIE DAWEK DZIELONYCH	
Zalecana dawka	2 x 30 g/ha środka + adiuwant Trend® 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody)
Termin stosowania	od fazy 2 liści do fazy 4 liści słonecznika (BBCH 12 -14)
Zalecana ilość wody	100 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie	średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym	2

*rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

ZĘ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.