



**FMC**



# Spotlight® Plus 060 EO

Ochrona przed zachwaszczeniem

**Nie trać czasu na odrosty**

Dowiedz się więcej: [www.spotlightplus.pl](http://www.spotlightplus.pl)

## Spotlight® Plus

jest środkiem chwastobójczym w formie emulsji (woda w oleju), stosowanym nalistnie, przeznaczonym do niszczenia rozłogów i zwalczania chwastów dwuliściennych w międzyrzędziach w uprawie truskawki oraz niszczenia odrostów korzeniowych i zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie maliny, jeżyny, porzeczki czarnej i czerwonej, borówki wysokiej.

## Stosowanie Spotlight® Plus w roślinach jagodowych pozwala na:

1. Ograniczenie konkurencji chwastów dwuliściennych.
2. Kontrolę odrostów korzeniowych i rozłogów.
3. Optymalizację ilości i jakości plonu roślin jagodowych.
4. Zmniejszenie nakładu pracy ręcznej lub mechanicznej w profesjonalnej produkcji roślin jagodowych.

## Mechanizm działania Spotlight® Plus:

Środek zawiera karfentrazon etylowy, inhibitor oksydazy protoporfirynogenu (PPO), zwiększający wrażliwość roślin na światło (działanie fotodynamiczne) i w konsekwencji powodujący ich uszkodzenie. Środek działa kontaktowo, pobierany jest poprzez zielone części roślin, a proces zasychania (niszczenia) pędów rozpoczyna się od wierzchołków wzrostu rośliny.



## Spotlight® Plus – efektywne stosowanie w uprawach jagodowych:

- truskawka
- malina
- jeżyna
- porzeczka czarna
- porzeczka czerwona
- borówka wysoka.



### OPTYMALNA DAWKA WODY PRZY STOSOWANIU SPOTLIGHT® PLUS:

- Dobór właściwej dawki wody, umożliwiającej uzyskanie prawidłowego pokrycia roślin, daje lepsze rezultaty.
- Dobranie techniki zabiegu (opryskiwacz/dysza/parametry), ma to wpływ na równomierne naniesienie cieczy na rośliny.



### WPŁYW DODATKU ADIUWANTÓW NA SPOTLIGHT® PLUS:

- Formulacja produktu została zoptymalizowana pod kątem substancji pomocniczych/adiuwantów.
- Dodatek innych adiuwantów nie wpływa na skuteczność produktu.



### OPTYMALNY CZAS STOSOWANIA SPOTLIGHT® PLUS TO:

- Zaplanowanie zabiegu na słoneczne dni.
- Zastosowanie produktu na początku dnia, aby uzyskać lepsze rezultaty niż po południu.



## OPTYMALNE DAWKI STOSOWANIA SPOTLIGHT® PLUS:



### ■ Truskawka:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

### ■ Malina, jeżyna, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, borówka wysoka:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.



## OPTYMALNE WARUNKI STOSOWANIA SPOTLIGHT® PLUS:



- Zabiegi wykonać w międzyrzędziach, opryskując bardzo dokładnie rosnące chwasty i odrosty korzeniowe/rozłogi.
- Nie dopuścić do opryskiwania liści i sąsiadujących roślin uprawnych.
- Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
- Zaleca się stosowanie osłon zapobiegających znoszeniu cieczy użytkowej na liście i pędy truskawek, na liście krzewów: malin, jeżyn, porzeczek czarnych, porzeczek czerwonych i borówki wysokiej.
- Nie stosować podczas wysokich temperatur, a także gdy do 1 godziny po wykonaniu zabiegu spodziewany jest deszcz.
- Produkt wykazuje większą skuteczność na chwasty w ich wcześniejszych fazach rozwojowych.

