


FORMULA COMPLEX



Aktywizacja pobierania przez rośliny dzięki Formule Complex

Każdy z nawozów dolistnych posiada składniki wspomagające pobieranie pierwiastków przez roślinę oraz ułatwiające przeprowadzenie zabiegu:

- Ułatwiają pobieranie przez woskową okrywę liści
- Pobudzają rośliny do intensywnego pobierania składników odżywczych
- Zwiększają równomierne i trwałe pokrycie liści
- Ograniczają interakcje z innymi produktami
- Maksymalizują bezpieczeństwo roślin uprawnych

SKŁAD


- Bor51 g/l
- Cynk71 g/l
- Mangan92 g/l
- Molibden..4,4 g/l
- Siarka160 g/l
- Azot60 g/l
- Składniki wspomagające

FORMULA COMPLEX



Rzepak plonujący około 4 t/ha posiada następujące zapotrzebowanie na kluczowe dla niego mikroelementy:

- Bor - 240 g/ha
- Mangan - 480 g/ha
- Molibden - 8 g/ha
- Cynk - 360 g/ha



WYSOKA KONCENTRACJA SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

B
(Bor)

połowa rocznego zapotrzebowania

Mo
(Molibden)

całoroczne zapotrzebowanie

Już przy jednym zabiegu dostarcza rzepakowi większość kluczowych mikroelementów

FMC

Rapsin

Nawożenie roślin

Wstęp do wysokich plonów rzepaku

Dowiedz się więcej: www.nawozy-fmc.pl

Rapsin

Umożliwia roślinom
rzepaku plonowanie na
najwyższym poziomie

dzięki dostarczeniu
dużych ilości
kluczowych dla nich
mikroelementów

KIEDY STOSOWAĆ?

Gdy rośliny tego
najbardziej potrzebują:

- **JESIENIĄ**
aby przygotować je
do zimowego spoczynku
- **WIOSNĄ**
aby uruchomić intensywny
przyrost masy

Stosować co najmniej
200 litrów/ha

1,0-3,0 l/ha w zależności od
poziomu niedoboru mikroelementów

Rzepak

Zastosować w stadium 4-9 liści i jeśli potrzeba
powtórzyć 10-14 dni później. Następny zabieg
można przeprowadzić wiosną, na początku
wzrostu pędu głównego.

Rośliny strączkowe (fasola, groch, soja)

Zastosować na początku wegetacji, kiedy
rośliny mają już wystarczającą powierzchnię
liści do przyjęcia oprysku. Zabieg można
powtórzyć po 10-14 dniach, nie później jednak
niż 4 tygodnie przed zbiorem.

Warzywa kapustne

Zastosować na początku wegetacji, kiedy
rośliny mają już wystarczającą powierzchnię
liści do przyjęcia oprysku. Zabieg można
powtórzyć po 10-14 dniach, nie później jednak
niż na 4 tygodnie przed zbiorem.

Kukurydza

Stosować po osiągnięciu przez rośliny fazy
5 liści i jeśli potrzeba powtórzyć.

DLACZEGO Rapsin?

- Produkt stworzony
specjalnie dla rzepaku
- Wysoka koncentracja
mikroelementów
- Najlepszy przelicznik
jakości do ceny
- Doskonałe parametry
działania dzięki
Formule Complex



SKONTAKTUJ SIĘ
Z PRZEDSTAWICIELEM
HANDLOWYM FMC
Z TWOJEGO REGIONU



FMC Agro Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
tel. +48 22 397 17 86, www.ag.fmc.com/pl