

# BeFlex® 500 SC Ogräsmedel

Höstbehandling i spannmål med fokus på örtogräs och åkerven

## ÖRTOGRÄS - ÅKERVEN

REGISTRERINGSNUMMER	5951		
VERKSAMT ÄMNE	500 g/L beflubutamid	HRAC Grupp	112 (tidigare F1)
FORMULERING	Suspensions koncentrat (SC)		
BEHÖRIGHETSKLASS	2L		
INNEHÅLL	5 L		

### PRODUKT EGENSKAPER EFFEKTER

- Innehåller beflubutamid, en helt ny aktiv substans för den svenska marknaden
- Effektiv på flera viktiga ogräs, t.ex. våtarv, vallmo, viol, plister, svinmålla, spillraps, lomme, trädgårdsveronika, förgätmigej och åkerven. Viss effekt även på losta och rajgräs
- Jordverkande, men har även viss bladverkan på små ogräs
- Kan blandas med andra produkter för bredare effekt på gräsogräs

### ANVÄNDNING

BeFlex® 500 SC är godkänd för höstbehandling i spannmål enligt nedanstående sammanfattning. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts. Läs etiketten för fullständiga villkor före användning.

BeFlex® 500 SC innehåller den aktiva substansen beflubutamid och är en systemisk jordherbicid som främst tas upp via rötterna, men som även har en bladverkan på små ogräs. Effekten är bäst på groende, eller mycket små ogräs som redan grott och där fotosyntesen är igång. Beflubutamidens långtidsverkan gör att även ogräs som gror senare bekämpas effektivt.

Effekten av BeFlex® 500 SC är oberoende av temperaturen, men behandling vid temperaturer över 25 °C rekommenderas inte. Behandla helst på torra plantor. Vid fuktigt och varmt väder görs behandlingen med fördel på kvällen. Sådjupet ska vara minst 2-3 cm för att undvika risk för skador på grödan. Bearbeta inte jorden efter behandling (t.ex. harvning eller vältning). BeFlex® 500 SC är regnfast efter 2 timmar.

GRÖDA	SYFTE	BEH. UTRUSTNING	UTV. STADIUM	MAX ANTAL BEH.	MAX DOS PRODUKT	MAX DOS VERKSAMT ÄMNE
Höstvete, höstråg, höstrågvete, höstkorn	Mot örtogräs och åkerven	Bomspruta	BBCH 10-25 Endast höstbehandling	1 per år	0,5 L/ha	250 g beflubutamid/ha





## Behandlingstidpunkt och rekommendationer

BeFlex® 500 SC får användas i spannmålens stadiet 10-25, men har bäst effekt vid behandling vid, eller strax efter grödans uppkomst. Full dos, 0,5 L/ha BeFlex® 500 SC, ger god effekt på snärjmåra och blåklint och mycket god till utmärkt effekt på de övriga vanligast förekommande örtogräsen och på åkerven. Viss effekt kan även förväntas på losta och rajgräs (ca 60%).

## Blandningar

BeFlex® 500 SC är blandbar med andra produkter, både insekticider, andra herbicider och mikronäring. Undvik att blanda med mikronäring innehållande bor. Läs alltid blandningsprodukternas etikett före blandning.

## Rekommenderad vattenmängd

Applicera BeFlex® 500 SC i minst 200-400 liter vatten per ha. Säkerställ bra marktäckning.

## Omsådd och efterföljande grödor

BeFlex® 500 SC utgör ingen risk för efterföljande grödor. Efter skörd av grödor som behandlats med BeFlex® 500 SC kan alla grödor sås. Vid omsådd efter behandling med BeFlex® 500 SC kan alla grödor utom vårraps sås 12 veckor efter utförd behandling. Plöj till minst 10-15 cm djup.

## EFFEKTER

Ogräs		0,5 L/ha	0,25 L/ha	0,3-0,4 L/ha BeFlex® + 2-3 L Boxer®
Baldersbrå	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	***	**	***
Blåklint	<i>Centaurea cyanus</i>	**	**	**
Fårtunga	<i>Anchusa arvensis</i>	***	**	
Jungfrukam	<i>Aphanes arvensis</i>	****	**	
Jordrök	<i>Fumaria officinalis</i>	****	**	****
Kamomill	<i>Matricaria chamomilla</i>	***	**	***
Lomme	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	****	***	****
Näva	<i>Geranium sp.</i>	***	***	***
Penningört	<i>Thlaspi arvense</i>	****		
Plister	<i>Lamium sp.</i>	****	***	****
Snärjmåra	<i>Galium aparine</i>	***	**	***
Spillraps	<i>Brassica napus</i>	****	**	****
Stillfrö	<i>Descurainia sophia</i>	****	****	
Svinmålla	<i>Chenopodium album</i>	****	****	
Kornvallmo	<i>Papaver rhoeas</i>	***	**	***
Veronika	<i>Veronica sp.</i>	***	**	****
Våtarv	<i>Stellaria media</i>	***	**	****
Åkerbinda	<i>Fallopia convolvulus</i>	****	****	
Åkerförgätmigej	<i>Myosotis arvensis</i>	****	***	****
Åkerkulla	<i>Anthemis arvensis</i>	****	****	
Åkersenap	<i>Sinapis arvensis</i>	****	****	****
Åkerviol	<i>Viola arvensis</i>	****	***	****
Sandlosta	<i>Bromus sterilis</i>	**	*	**
Vitgröe	<i>Poa annua</i>	*		***
Åkerven	<i>Apera spica-venti</i>	***	**	****
Renkavle	<i>Alopecurus myosuroides</i>	-	-	**

Utmärkt effekt (\*\*\*\*) 95-100%  
 Mycket god effekt (\*\*\*) 85-94.9%  
 God effekt (\*\*) 70-84.9%  
 Måttlig effekt (\*) 50-69.9%  
 Otillräcklig effekt (-) ≤50%



SKANNA FÖR ATT FINNA ETIKETT OCH  
SÄKERHETSATABLAD PÅ FMCAGRO.SE