

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi Ve No.su: 19.04.2022 ve 12330

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Edilen Yabancıotlar	Uygulama dozu ve dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre (gün)
Mısır	Kırmızı Köklü Tilki Kuruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Adi eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>)	200 ml/da (çıkış öncesi)	-
Fasulye ✓	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	150 ml/da (çıkış öncesi)	90
Patates ✓	Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	200 ml/da (çıkış öncesi)	-
Pamuk	✓ Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i> L.) ✓ Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) enekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i> L.) ✓ Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) ✓ Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i> L.) ✓ Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	300 ml/da (çıkış öncesi)	-
Nohut ✓	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	200 ml/da (çıkış öncesi)	-
Ayçiçeği	✓ Sirken (<i>Chenopodium album</i>) ✓ Bozot (<i>Heliotropium europaeum</i>) ✓ Yatık Sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>) ✓ Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	200 ml/da (çıkış öncesi)	-
Bezelye	✓ Sirken (<i>Chenopodium album</i>) ✓ Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	150 ml/da (çıkış öncesi)	90
Soya Fasulyesi	✓ Sirken (<i>Chenopodium album</i>) ✓ Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) ✓ Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	200 ml/da (çıkış öncesi)	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Debasco® önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız. Yelpaze hüzmeli meme kullanılmı ve dekara atılacak su miktarı 20-40 litre olmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
13 Eylül 2022

FMC

DEBASCO®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	K3	Herbisit (Yabancıot ilacı)
-------	----	----------------------------

600 g/l Pethoxamid

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Kendinizi korumadan (örn. maske) suni tenffüs uygulamayınız. Kendi güvenliğinize dikkat edin. Herhangi bir sağlık problemi çıkarsa veya böyle bir durumdan şüphelenirseniz, doktora bilgi verin ve ona güvenlik bilgi formundan bilgiler sunun. Bilinci yerinde değilse, kişiyikoma pozisyonuna getirin, başını hafifçe geriye doğru eğin ve solunum yollarının açık olduğundan emin olun. Asla kusturmaya çalışmayın. Kişi kendiliğinden kusarsa, kusmuşunu solumasına engel olun. Hayatı tehdit eden koşullar altında öncelikle etkilenen kişiyi hayata döndürülmesini ve tıbbi yardım almasını sağlayın. Solunum durması - derhal suni tenfüs yapın. Kalp durması - hemen dolaylı kalp masajı yapın.

Yutulması halinde: Etkilenen kişi kusarsa, kusmuşu solumasını engelleyin (son derece küçük miktarlarda bile olsa bu sıvıların solunum yollarına solunması akciğerlerde hasara yol açabilir). En az 24 saat boyunca daha ileri gözlem yapılması ihtiyacını dikkate alarak tıbbi tedavi başlatın. Uygun şekilde, etiketli orijinal kabı ve verilen maddenin Güvenlik Bilgi Formunu getirin.

Göz ile teması halinde: Gözleri hemen musluk suyu ile yıkayın, göz kapaklarını açın (gerekirse kuvvet kullanın); varsa, etkilenen kişiyi kontak lenslerini hemen çıkarın. Hiçbir durumda nötralizasyon yapılmamalıdır! Diğer gözün etkilenmesini önlemek için, göz pınarlarından dış göz köşesine kadar durulamaya 10-30 dakika boyunca devam edilmelidir. Duruma bağlı olarak, tıbbi kurtarma servisini arayın veya mümkün olduğunca çabuk tıbbi tedavi başlatın. Çok az etkilenmiş bile olsa herkes tedaviye yönlendirilmelidir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

® FMC'nin tescilli markasıdır.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net Miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Pethoxamid içerir.

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P264 Elleçlemeden sonra eller ve vücudun maruz kalan kısımları su ile iyice yıkayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 CİLT ÜZERİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASINDA HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310 Hemen bir ZEHİR MERKEZİ/doktoru arayınız.
P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- İlaç atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalıklarına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayın, usulüne uygun imha edin.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FMC

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
MERSİS No: 038808294600001

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Mısır: Uygulamanın mısır bitkisinin ekiminden sonra, mısır ve yabancı otlar çıkmadan yapılması tavsiye edilir. Yelpeze hüzmeli meme kullanılarak dekara 30-40 litre su uygulanmalıdır.

Fasulye: Tavsiye edildiği dozda hazırlanan ilaçlı karışım, fasulye ekiminden sonra yabancı otların çıkışından önce dekara 30-40 litre su ile uygulanır.

Patates: Keseklerden ve daha önce ekilen bitkilerin artıklarından temiz hale getirilmiş toprağa; patates ekiminden sonra yabancı otların çıkışından önce uygulanır.

Pamuk: Tavsiye edildiği dozda hazırlanan ilaçlı karışım, pamuk ekiminden sonra yabancı otların çıkışından önce dekara 30-40 litre su ile uygulanır.

Nohut: Tavsiye edildiği dozda hazırlanan ilaçlı karışım, nohut ekiminden sonra yabancı otların çıkışından önce dekara 30-40 litre su ile uygulanır.

Ayçiçeği: Tavsiye edildiği dozda hazırlanan ilaçlı karışım, ayçiçeği ekiminden sonra yabancı otların çıkışından önce dekara 30-40 litre su ile uygulanır.

Bezelye: Tavsiye edildiği dozda hazırlanan ilaçlı karışım, bezelye ekiminden sonra yabancı otların çıkışından önce dekara 30-40 litre su ile uygulanır.

Soya fasulyesi: Tavsiye edildiği dozda hazırlanan ilaçlı karışım, soya fasulyesi ekiminden sonra yabancı otların çıkışından önce dekara 30-40 litre su ile uygulanır.

Debasco® uygulanan tarlanın tahminden erken bozulması durumunda uygulamadan 6 hafta sonra soya fasulyesi, ayçiçeği, yonca, fasulye ve mısır ekimi yapılabilir.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

Debasco® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre K3 grubu olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Debasco®'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (K3 grubu harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı için mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABULE DİLMİŞTİR

13 Eylül 2022

FMC
DEBASCO®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	K3	Herbisit (Yabancıot İlacı)
-------	----	----------------------------

600 g/l Pethoxamid

Deri ile teması halinde: Kirlenmiş kıyafetleri çıkarın. Etkilenen bölgeyi bol ve mümkünse ılık suyla yıkayın. Cilt yaralanması yoksa sabun, sabun çözeltisi veya şampuan kullanılmalıdır. Cilt tahrişi devam ederse tıbbi tedavi başlatın.

Solunması halinde: Kendi güvenliğinize dikkat edin ve etkilenen kişinin yürütmesine izin vermeyin! Hemen maruz kalma durumunu sonlandırın ve etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın. Kirlenmiş giysilere dikkat edin. Duruma bağlı olarak, tıbbi kurtarma servisini arayın ve en az 24 saat boyunca daha ileri gözlem yapılması ihtiyacını dikkate alarak tıbbi tedavi başlatın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Spesifik bir tedavi şekli yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

FİRMA BEYANI:

FMC bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsül zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ilaçla tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

Ruhsat Sahibi Firma:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/İstanbul
Tel: 0 216 900 24 81
Faks: 0 216 900 24 82
Acil durum tel. (Chemtrec): 0 212 705 53 40


Üretici ve Üretim Tesisi:

Cheminova A.S. Thydoronvej 78 DK-7673 Harboore Danimarka

FMC

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
MERSİS No: 038808294600001

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili



© FMC'nin tescilli markasıdır.