

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
Şarj No:
Ruhsat Tarihi Ve No.su: 25.04.2016/10613

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	50 ml/da	3 gün
Domates (Sera)	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	50 ml/100 L su	3 gün
	Toprak Kökenli Fungal Patojenler (<i>Fusarium Spp.</i> , <i>Phytophthora Spp.</i>)	200 ml/da	3 gün
	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Soğan	Mildiyö (<i>Peronospora destructor</i>)	50 ml/da	7 gün
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	50 ml/da	7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Fiado önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Damlama sulama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 memenin akış debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates: Domates Mildiyö (*Phytophthora infestans*) Çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında, kahverengi lekelerin altında beyaz küllü gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

M. Q

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

09 Nisan 2021

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.

FMC
FIADO

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	C5: 29	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	--------	-------	----------------------------

375 g/L Fluazinam +150 g/L Azoxystrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri göstermektedir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Hemen tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

Soluma: Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitimli personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Denetim Başkanı

© FMC'nin tescilli markasıdır.

Net Miktarı :
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Fluazinam, Azoxystrobin içerir
ZARARLILIK İŞARETİ



Uyarı Kelimesi: **TEHLİKE**

ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H332 Solunması hâlinde zararlıdır.
H361d. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı bertaraf edin
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürünü atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Son uygulama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
- Bitki koruma ürünü mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin.

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Beşinyalı Sok. No:3
Nida Kule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
MERSİS No: 0388082946000001

Patates: Patates Mildiyö (*Phytophthora infestans*) Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Domates(sera): Domates Erken Yaprak Yanıklığı (*Alternaria solani*)
Gerek fidelede gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates(sera): Toprak Kökenli Patojenler (*Fusarium Spp., Pythium Spp.*)
Damla sulama uygulamasında Bitki Koruma Ürünü fideler seraya şaşırtıldıktan sonra fidelerin kök bölgesine verilir. Uygulama öncesi, sade sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı belirlendikten sonra gerekli bitki koruma ürünü miktarı uygulama tankına konur ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılır. Uygulama bittikten sonra da borularda kalan bitki koruma ürününün temizlenmesi için makul bir süre su verilir. Uygulama 15 gün sonra tekrar edilir.

Domates (sera): Kurşuni Küf (*Botrytis cinerea*): Uygulamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme evresinde iken başlanmalı, 10 gün aralıklarla devam edilerek 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Soğan: Mildiyö (*Peronospora destructor*): Günlük ortalama sıcaklıkların 16 dereceye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir. 14 gün arayla 2 uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Fiado adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre C5: 29 ve C3: 11 grubu olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Fiado'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (C5: 29 ve C3: 11 grubu harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Karışım halinde kullanılacak ise ön karışım testi ile denenmesi önerilir. Diğer Bitki Koruma Ürünleri ve yağ bazlı ürünler ile karışımı önerilmez.

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.

FMC
FIADO

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	C5: 29	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	--------	-------	----------------------------

375 g/L Fluazinam +150 g/L Azoxystrobin

Deri ile temas: Maddenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla maruziyetten kaçınılmalıdır. Kirliliği sabun ve suyla veya bilinen cilt temizleyici bir madde ile temizleyin. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Göz ile temas: Hemen bol su ile yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın.

Yutulma: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Herhangi bir protez mevcut ise çıkarın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Kusma meydana gelirse, kusmuğun akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır. Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Belirli bir antidotu yoktur spesifik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

® FMC'nin tescilli markasıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ürünlerin kalitesini garanti eder; fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Üretici Firma:

CHEMINOVA A/S
Thyboronvej 78 DK-7673 Harboore
Danimarka

Üretim Tesisi (Fabrika):

Chemnova Deutschland GmbH & Co. KG Stader
Elbstraße 28, 21683 Stade, Almanya

Ruhsat Sahibi Firma:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/Istanbul
Tel: 0 216 900 24 81
Faks: 0 216 900 24 82
Acil durum tel. (Chemtec): 0 212 705 53 40

FMC

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
MERSİS No: 0388082946000001

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
09 Temmuz 2021
KABUL EDİLMİŞTİR.