

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.
Şarj No:
Ruhsat Tarihi Ve No.su: 14.03.2014 / 9548

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR :

Bitki Adı	Zararlı Adı	Doz ve Dönemi	Son İlaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
Hıyar (sera)	İki Noktalı Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 lt su	3

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Yapraktan uygulamalarda traktör ve sırt pulverizatörleri ile motorlu atomizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış bekleyen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır.

İLAÇLAMA ALETİNİN KALİBRASYONU: İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Ağaç başına veya dekara kullanılacak su miktarını belirlemek için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar sadece su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile belirli sayıda ağaç veya belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir ağaç başına veya dekara ne kadar ilacli su harcanacağı hesaplanmış olur.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI: İlaçlama aleti yarisına kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin karıştırma teşkilatı çalıştırılarak hazırlanan ilacli su ilaçlama aletine konularak, kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlacli mahlul her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

KULLANIM ŞEKLİ:

Hıyar: Yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

İmera 18 EW adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 6 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir-akarısittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için İmera 18 EW'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (6. grup harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

FMC

IMERA 18 EW

EMULSİYON SUDA YAĞ (EW)

Grubu	6	Insektisit+Akarisit (Böcek ve Kırmızı Örümcek İlacı)
-------	---	--

18 g/l Abamectin

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
- İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELĐVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- İLAÇLAMA SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİGARA İÇMEYİNİZ.
- DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
- İLAÇLANMIŞ SAHAYA 2 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Göz bebeklerinde büyüme adalelerinde konsantrasyon bozukluğu ve kaslarda kasmaya neden olur.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Göz Teması halinde: En az 15 dk bol temiz su ile yıkayınız.

Deriye Teması Halinde : İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız ve temas eden kısımları sabun ve suyla en az 15 dakika yıkayınız.

Solunması Halinde : Hastayı temiz havaya çıkarınız. Gerekirse suni teneffüs yaptırınız. Derhal tıbbi yardım alınız.

Yutulması Halinde : Fazla miktarda alınması halinde hasta kendinde ise 1-2 bardak su içirerek kusmasını sağlayınız. Hasta kendinde değilse kusturmaya çalışmayınız. Derhal tıbbi yardım alınız.

05 Nisan 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı :

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Abamectin ve Distilates hydrotreated içerir.

Zararlılık işaretleri



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması hâlinde zararlıdır.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ

P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P501 İçeriği/kabı bertaraf edin

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- İlaç yanabilir özellikte olduğundan ateşten uzak tutunuz.
- İlaç atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
- İlacli mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayın usulüne uygun imha edin.

FMC
FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

2. sayfa

KARIŞABİLİRLİK : Diğer ilaçlarla karışabilirlik durumu test edilmelidir. İlaçlara karşı oluşacak mukavemet nedeniyle, farklı etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanılması icap eden programlarda tavsiye edilmektedir.

FMC
IMERA 18 EW
EMULSİYON SUDA YAĞ (EW)

Grubu	6	Insektisit+Akarisit (Böcek ve Kırmızı Örümcek İlacı)
-------	---	--

18 g/l Abamectin

ANTİDOTU ve TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antitodu yoktur. Semptomatik tedavi yapılır. Zehirlenme halinde hasta 30 dk. içinde kusturulmalıdır. Tıbbi kömür verilmelidir. Avermectin B1 GABA aktivitesini hızlandıracağı için Barbiturate, Benzodiazepin, Valproic acid türü ilaçlar verilmelidir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda ve orijinal ambalajında depolandığında 4 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ilaçların kalitesini garanti eder; fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

Cheminova A/S
Thyboronvej 76-78 DK-7673 Harboøre-Danimarka

RUHSAT BAHİBİ FİRMA:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/İstanbul
Tel: 0 216 900 24 81
Faks: 0 216 900 24 82
Acil durum tel. (Chemtrec) : 0 212 705 53 40



05 Nisan 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

FMC
FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Dr. Murat KAHYAĞLU
Teknik Müdür