

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır  
Seri No:  
t Tarih ve No.: 29.09.2014/ 9838  
Ek-2

### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Buğday	Sarı pas ( <i>Puccinia striiformis</i> )	100 ml/da	56 gün
Buğday	Tahıl Küllemesi ( <i>Erysiphe graminis</i> )	100 ml/da	56 gün
Buğday	Septoria Yaprak Lekesi ( <i>Septoria tritici</i> )	100 ml/da	56 gün

### BITKİKORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan IMPACT® T önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durundayken karışım depoya ilave edilir. Karışıma devam edilecek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamamın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Buğday sarı pas:** Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas emenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. **Buğdayda tahıl küllemesi:** İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla buluşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KAYIRI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

13 Haziran 2013

# FMC

## IMPACT® T SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	G1: 3	Fungisit (Mantar ilacı)
225 g/l Tebuconazole + 75 g/l Flutriafol		

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulaması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulamış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Zehirlenme, bozulmuş hareketlilik, nefes darlığı, tükürük, kas spazmlar ve artan vücut ısısına neden olabilir.

**ILKYARDIM ÖNLEMLERİ:** Hastayı sıcak tutarak doktora gidiniz. İlaç ve etkisini birlikte götürünüz.

**Solumun:** Hastayı temiz havaya çıkarın belirtiler görülürse soluk alıp verme düzenli değil ise veya durmuşsa suni solumun yapın.

**Deri ile temas:** Cildi derhal bol su ve sabunla yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkartın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın. Tahriş oluştursa tıbbi yardım alın.

**Göz ile temas:** Gözleri derhal bol su ya da göz yıkama solüsyonu ile göz kapakları açık bir şekilde kimyasal madde tamamen arınmaya kadar yıkayın; varsa kontak lensleri çıkarın, yıkamaya bir süre daha devam edin. Tercihen bir göz doktorundan geçirmeden yardım alın.

**Yutma:** Bilinci yerinde değil ise ağzından bir şey veremeyiniz. Ağzı iyice çalkalayınız. Hastayı kusturmaya zorlamayın. Derhal tıbbi yardım isteyiniz. İlacın etkisi ve ambalajını doktora gösteriniz.

® FMC'nin tescilli markasıdır.



Net miktarı:  
Azamî perakende satış fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:**  
Flutriafol, Tebuconazole içerir

**ZARARLILIK İŞARETİ**



**DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ**

1361d Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.  
H411 Suda ortama uzun süre kalıcı, toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ**

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.  
P202 Bütün önlemler fadeleri okunup anlaşılmasından önce okuyunuz.  
P273 Çevreye verilmemesinden kaçınınız.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanınız.  
P391 Döküntüleri toplayınız.  
P501 İçerdiği/kabı bertaraf edin.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.  
EUH208 (Hassaslaştırıcı maddenin ismi) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

**KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HİSUSLAR**

-Ayrıca zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.  
-Baklılara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.  
-Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır  
-Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahsulü hazırlamayınız.  
-Hazırlanan ilacın direk güneş ışığından korunması gerekir. İlacın kullanma ve içme sularına karışmasını manî olunuz.  
-Kullanımdan sonra boş ambalajları imha ediniz. Başka maddelerle kullanmayınız.

FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.  
Barbaros Mah. Beğonya Sok. No:3  
Nidakule Ateşehir Kuzey Kat:15/149  
Ateşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460  
MERSİS No:0388082946000001

Durmuş Demirel  
Şirket Yetkilisi

**Buğdayda septorya yaprak lekesi:** Eğer iklim koşulları hastalığın iline uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil uygulamaları uygulayın. Genel olarak uygulamaya için en iyi zaman jir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulasıkısa ve başaklanma döneminde yağışlı havalarda devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**IMPACT® T** (Flutriafol+Tebuconazole) adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grubu G1: 3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için IMPACT® T'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (G1: 3 grubu hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:**

Karışım yapılmadan önce bir ön karışım yapılması tavsiye edilir.

**FMC**  
**IMPACT® T**  
**SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)**

Grubu	G1: 3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	-------	-------------------------

**225 g/l Tebuconazole + 75 g/l Flutriafol**

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:** Belirli bir antidotu yoktur spesifik tedavi uygulanır. Yutulması halinde mide yıkanması veya aktif kömür uygulanmalıdır. Genel kimyasallara maruz kalındığında dekontaminasyon sonrası tedavi klinik koşullarda uygulanmalıdır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114**



® FMC'nin tescilli markasıdır.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ürünlerin kalitesini garanti eder. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

**ÜRETİCİ FİRMA:**

CHEMINOVA A/S  
P.O. Box 9 DK-7620 Lemvig Danimarka  
Tel:(+45) 96 90 96 90  
Faks: (+45) 96 90 96 91

**ÜRETİM YERİ:**

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG  
Städer Elbstr.28 – 21683 Almanyaa

**RUHSAT SAHİBİ**

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3 Nidakule  
Ateşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149 Ateşehir/İstanbul  
Tel: 0 216 900 24 81 Faks: 0 216 900 24 82  
Acil durum tel. (Chemtec) : 0 212 705 53 40

FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.

Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ateşehir Kuzey Kat:15/149  
Ateşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460  
MERSİS No: 0388082946000001

**Durmuş DEMİREL**  
Şirket Vekili

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
CİDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

13 Haziran 2023