

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır
Sarıf No:
Ruhsat Tarihi ve No.: 04.01.2022/12200

KULLANILACAK İTİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

İtİtkİ Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre (gün)
Buğday	Septorya Yaprak Lekesi (Septoria tritici)	70 ml/da	56
Arpa	Arpa yaprak yanıklığı (Rhynchosporium secalis)	70 ml/da	56

İTİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan NANOK önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumda karışım depoya ilave edilir. Karşıtmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karşıtmaya işleme devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

İTİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Buğday Septorya Yaprak Lekesi: İlk hastalık belirtileri görüldüğü zaman 1. ilaçlama, gerektiğinde veya iklim şartlarının hastalığın seyrini için uygun olduğu durumlarda 1. ilaçlamadan 22-28 gün sonra ise 2. ilaçlama yapılmalıdır.

Arpa yaprak yanıklığı: Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve koşullar hastalığın gelişimi için uygun olarak seyrederse ilacın etki süresi de dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılabilir.

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

FMC
NANOK

Grubu	C3: 11	G1: 3	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	--------	-------	-------------------------

125 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Flutriafol

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- İtİtkİ koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- İtİtkİ koruma ürünü uygulandıktan sonra 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Hemen tıbbi yardım alın. Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

Solumun: Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonunda sırtak tutun ve dinlendirin. Solumun yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solumun zorluğu geçildikçe, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solumunun gerçekleştirilmesini sağlayın.

Deri ile temas: Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Göz ile temas: Hemen bol su ile yıkayın. Kontak lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın.

® FMC'nin tescilli markasıdır.

Net miktar :
Azami perakende satış fiyatı :

İNDİKELER: Azoxystrobin, Flutriafol

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H332 Soluması halinde zararlıdır.
H400 Suda ortamda çok toksiktir.
H411 Suda ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.
P304+P340 **SOLUNDUĞUNDA:** Zehir gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonunda tutun.
P391 Döküntüleri toplayın.
F01 İçerik/kabı bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
-Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
-Kuşlar, toprak mikro ve makro organizmaları için zararlı olarak kabul edilmez.
-Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır
-Aynı gün tüketilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahsul hazırlamayınız.
-Hazırlanan ilacın direk güneş ışığından korunması gerekir.
-İlacın kullanma ve içme sularına karışmasına mani olunuz.
-Ürün suda yaşayan organizmalar için tehlikelidir ve sucul ortamlarda ters etkilere sebep olabilir. Ambalajları/Kapları çevreye, göl ve akarsulara, kanalizasyona atılmamalıdır. Yerel yetkililerle mercilere teslim ediniz

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN KULLANILMASI
ÇARŞI KENTİ
KENT MERKEZİ



FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ ŞİRK. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Beğonya Sok. No:13
Nispetiye/Ataşehir/İST. TÜRKİYE
Ataşehir / İST. TÜRKİYE VİD. 3836-73-60
MENSİS No: 038508294650001

DURMUŞ DEMİREL
Şirket Vekili

03 Şubat 2023

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Nanok® adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grubu C3:11 ve G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Nanok®'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3:11 ve G1:3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞABİRLİK:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez. Eğer karışım yapılacaksa mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

**FMC
NANOK
SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)**

Grubu	C3: 11	G1: 3	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	--------	-------	-------------------------

125 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Flutriafol

Yutma: Ağzı suyla iyice çalkalayın. Herhangi bir protez mevcut ise çıkarın. Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Kusma meydana gelirse, kusmuğun akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermayın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonunda sıcak tutun ve dinlendirin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysisinin sıkı bölümlerini gevşetin.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Hastada gözlenen belirtiler değerlendirilerek uygun tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

® FMC'nin tescilli markasıdır.

İEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan epolanıldığına 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

FMC bu ilacın etiketeki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikete yer almış kullanma geyesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları (radan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zararı, tesisizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ilaçta tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN (AYEELER DIŞINDA NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER AŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

İretim Tesisi (Fabrika):

Therminova Deutschland GmbH & Co.KG
Kader Elbstrasse 26, 21683 Stade, Almanya

İretici Firma:

FMC Agricultural Solutions A/S,
Tyborønvej 78, DK-7673 Harbørre, Danimarka

İhbat Sahibi

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
İldakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/İstanbul
Tel: 0 216 900 24 81
Faks: 0 216 900 24 82

Kcili durum tel. (Chemtrec): 0 212 705 53 40



FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3

İldakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI Y.D. 3830829460
MERSİS No:02880082946000001

Durmuş Demirel
Şirket Vekili

TARİHİ: 03 Şubat 2023

CSA YAZICI: 03 Şubat 2023

03 Şubat 2023

03 Şubat 2023

82X

