

İmal tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat tarihi ve numarası: 08.09.2022 / 12499

**FMC**

Ek

Net Miktarı:  
Azami Perakende Sı

**KULLANILACĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR**

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (tarla)	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	6 ml/da	1 gün
Bağ	Salkım güvesi ( <i>Lobesia botrana</i> )	5 ml/100 L su (yumurta - larva)	3 gün (Sofralık üzüm) 28 gün (Şaraplık üzüm) 7 gün (asma yaprağı)
Pamuk	Pamuk yaprakkurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )	6 ml/da	21 gün
	Dikenlikurt ( <i>Earias insulana</i> )		
Elma Armut Ayva	Elma içkurdu ( <i>Cydia pomonella</i> )	4 ml/100 L su (yumurta - larva)	14 gün

**PRESTICOR® 600 SC**

Suspansiyon Konsantr (SC)

Grup	28	Insektisit (Böcek İlacı)
------	----	--------------------------

600 g/L Chlorantraniliprole

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ  
EVDE KULLANMAYINIZ.  
ÇOCUKLARDAN VE GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ,  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/ VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.  
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.  
BU BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANDIĞI SAHAYA İNSAN VE HAYVANLARIN TEKRAR GİRİŞİ İLE İLGİLİ BİR KISITLAMA BULUNMAMAKTADIR. İLAÇ KURDUKTAN HEMEN SONRA UYGULAMA YAPILAN ALANA GİRİLEBİLİR.  
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalajı veya etiketini birlikte götürünüz.  
**Yutulması halinde:** Gargara yapın (yaptırın). Sorun olması durumunda tıbbi yardım alın.

**Göze teması halinde:** Gözleri hemen musluk suyu ile yıkayın, göz kapaklarını açın (gerekirse kuvvet kullanın); varsa, etkilenen kişinin kontak lenslerini hemen çıkarın. Durulma en az 10 dakika devam etmelidir.

**Deriyle teması durumunda:** Kirlenmiş kıyafetleri çıkarın. Etkilenen bölgeyi bol ve mümkünse ılık suyla yıkayın. Cilt yaralanması yoksa sabun, sabun çözeltilisi veya şampuan kullanılmalıdır. Cilt tahrişi devam ederse tıbbi tedavi başlatın.

**Soluması halinde:** Hemen maruz kalma durumunu sonlandırın ve etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın. Kişiyi artan soğumaya karşı koruyun. Tahriş, solunum güçlüğü veya diğer semptomlar devam ederse tıbbi tedavi başlatın.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidot yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki **Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)** telefon numarasını arayarak ilk yardım için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

**Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114**

© FMC'nin tescilli markasıdır.



**İÇİNDEKİLER:** Chlorantraniliprole  
**ZARARLILIK İŞARETİ:**



**DİKKAT ZARARLILIK İFADELERİ:**

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ:**

P273 Çevreye salınmasından kaçının.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet kullanın.  
P391 Döküntüleri toplayın.  
P501 İçindekileri/konteynerleri yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun şekilde onaylanmış tesislerde bertaraf edin.  
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Arılar için zehirlidir. Ürünün çiçeklenme döneminde kullanmayınız. İlaçlama bitlerinin aktif olmadığı zaman yapılmalıdır.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- İpek böceklerine etkisi olduğu için, ilaçlama anında ilacın rüzgarla yakındaki dut ağaçlarına taşınmasına engel olunuz.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

FMC bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ilaçla tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLAÇIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149  
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460  
MERSİS No: 038808294600001

**Durmuş DEMİREL**  
Şirket Vekili

6 Nisan 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

**Pamuk:**

Pamuk yaprak kurdu (*Spodoptera littoralis*): İlaçlama zamanının belirlenmesi için 50 dekarlık pamuk tarlası bir ünite kabul edilir. 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir.

Dikenlikurt (*Earias insulana*): Tarla sürveyinde 3 metrelik pamuk sırasında ortalama 2 larva veya 4 açılmaya yakın yumurta bulunduğu, koza sürveyinde ise %10 bulaşık koza varsa ilaçlama yapılmalıdır.

Pamukta sezon içinde aynı yerde 2'den fazla Presticor® 600 SC uygulaması yapmayınız.

**Bağ:**

Salkım güvesi (*Lobesia botrana*): Salkım güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeyssel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı henüz en üst seviyeye ulaşmayıp artışın devam etmesi, etkili sıcaklıklar toplamı birinci dönemde 95-100 günderece, ikinci dönemde 450-460 günderece, üçüncü dönemde 970-980 gündereceye ulaşması ve bitki fenolojisi; birinci dönemde çiçek tomurcuğu, ikinci dönemde koruk, üçüncü dönemde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde ve bağda ilk yumurta görülmeden ilaçlamaya karar verilir. Her döle karşı bir ilaçlama yapılır. Bağda sezon içinde sofralık üzümde 2, şaraplık üzümde 1'den fazla Presticor® 600 SC uygulaması yapmayınız.

**Elma, Armut, Ayva:**

Elma içkürdü (*Cydia pomonella*): Elma içkürdüne karşı ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Presticor® 600 SC ile bu zararlı ile mücadelede en iyi etki her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armut ve ayvada tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.

İlacın etki süresi dikkate alınarak 14 gün sonra 1. döle karşı ilaçlama tekrarlanmalıdır. İkinci ve daha sonraki dönemlere karşı da zararlı ilaçlamayı gerektirecek yoğunlukta olduğu takdirde aynı şekilde ilaçlamalara devam edilmelidir. Bu ilaçlamalar direnç ile ilgili bölümde belirtilen kurallara bağlı kalınarak farklı etki mekanizmasına sahip ilaçlar ile yapılmalıdır.

Elma, Armut ve Ayvada sezon içinde 2'den fazla Presticor® 600 SC uygulaması yapmayınız.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

Presticor® 600 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 28 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Presticor® 600 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 28 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLIK DURUMU:**

Formülasyonlarda değişiklikler olabileceği için kullanıcıların, geniş çapta uygulama yapmadan önce istenen karışımı küçük miktarlarda test ederek çökme ve katılaşma olup olmadığını gözlemlenmeleri önerilir. Farklı özelliklerde değişik materyallerin karışımı ve yoğun karışımlar tavsiye edilmez. Karışım yapılacaksa, Presticor® 600 SC'nin ve diğer karışım yapılacak pestisitlerin etiketinde yer alan sınırlamalara ve önlemlere uyunuz. Etiketinde yer alan kullanım dozunu aşmayın. Etiketinde bu tür karışımlarla ilgili sınırlamaları olan ilaçlarla karışım yapmayınız.

**FMC****PRESTICOR® 600 SC**

Suspansiyon Konsantre (SC)

Grup	28	Insektisit (Böcek İlacı)
------	----	--------------------------

600 g/L Chlorantraniliprole

**Ruhsat Sahibi:**

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149  
Ataşehir/İstanbul  
Tel: 0 216 900 24 81  
Faks: 0 216 900 24 82  
Acil durum tel. (Chemtrec) : 0 212 705 53 40

**Üretici Firma:**

FMC International Switzerland Sàrl  
Chemin des Blandonnet 8  
1214 Vernier İsviçre

**Üretim Tesisi:**

FMC Corporation 100 Niagara Street  
Middleport, New York 14105 ABD

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149  
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460  
MERSİS No: 038808294600001

**Durmuş DEMİREL**  
Şirket Vekili



® FMC'nin tescilli markasıdır.

6 Nisan 2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.