

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi: Üretim Tarihinden itibaren 2 yıldır
Şarj No:
Ruhsat Tarihi Ve No.su: 21.05.2014 / 9659

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı | Zararlı organizma adı | Uygulama dozu | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Biber (Sera) | Çiçek tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>) | 80 ml/da Larva, Ergin | 3 gün |
| Hıyar (Sera) | Çiçek tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>) | 95 ml/da Larva, Ergin | 3 gün |
| Kornişon (Sera) | Çiçek tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>) | 95 ml/da Larva, Ergin | 3 gün |
| Domates (sera) | Çiçek tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>) | 75 ml/100 l su Larva, Ergin | 3 gün |
| Patlıcan (Sera) | Çiçek tripsi (<i>Frankliniella occidentalis</i>) | 75 ml/100 l su Larva, Ergin | 3 gün |
| Kesme karanfil (<i>Dianthus</i> spp) (sera) | Tripsler (<i>Taeniothrips</i> sp., <i>Frankliniella occidentalis</i>) | 75 ml/100 l su Larva, Ergin | - |
| Kültür Mantarı | Mantar Sinekleri (<i>Sciaridae</i>) Gübre Sinekleri (<i>Phoridae</i>) Gal Sinekleri (<i>Cecidae</i>) | 0,85 ml / m ² / 1 L su | 5 gün |
| Pamuk | Tütün tripsi (<i>Thrips tabaci</i>) | 60 ml/da + 100 ml/da Codacide | 14 gün |
| | İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) | 50 ml/da + 100 ml/da Codacide | |
| Bağ | Bağ tripsleri (<i>Rubiothrips vitis</i> , <i>Mycterothrips albicomicis</i> , <i>Mycterothrips tschirkunae</i> , <i>Thrips tabaci</i>) | 75 ml/100 l su Larva, Ergin | 28 gün |

Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Rufast® 75 EW önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

FMC

RUFAS[®] 75 EW

EMULSİYON SUDA YAĞ (EW)

| | | |
|-------|----|---|
| Grubu | 3A | Insektisit-Akarisit (Böcek ve Kırmızı Örümcek İlacı) |
|-------|----|---|

75 g/l Acrinathrin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Solunum: Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Solunum güçlüğü varsa oksijen verin, soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Derhal bir doktora veya Ulusal Zehir Danışma merkezine ulaşın.
Deri ile temas: Derhal ürünün bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri 15 dakika boyunca akan su ve sabun ile yıkayın ve ardından talk pudrası ve daha sonra E vitamini bakım kremi uygulayın. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın. Tüm vücut teması varsa duş alın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.



© FMC'nin tescilli markasıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı :
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Acrinathrin içerir.

ZARARILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARILIK İFADELERİ

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
P391 Döküntüleri toplayınız.
P501 İçeriği/kabı bertaraf edin.
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- İlaç atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Son uygulama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayın, usulüne uygun imha edin.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FMC

FMC TURKEY ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ
Barbaros Mah. Beğonya Sok. No: 3
Nidaküle Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880934400
MERSİS No: 038808294600001

Dr. Mustafa YAOĞLU
Teknik Müdür

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin depoyu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates, Biber, Hıyar, Kornişon ve Patlıcanda Tripsler; Rufast 75 EW ağırlıklı olarak değme yolu ile etki eder. Püskürtüldüğünde çoğunlukla yaprak alt yüzeylerinde gizlenen, tripslere ulaşır ve başarılı bir kontrol sağlar. Bu nedenle ürün boyutuna bağlı olarak, yüksek spreysel kullanılması tavsiye edilir. Küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 adet, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet trips (ergin+larva) olduğunda mücadeleye başlanır.

Karanfilde Tripsler: Serayı temsilen seçilen 50 çiçek veya yaprakta yapılan sayımlarda ortalama 5 çiçek tripsi bulunduğunda ilaçlamaya başlanır.

Kültür Mantarlarında uygulama:

-Mantar üretim odalarında kompostta misel gelişim döneminde ortalama 15 adet veya örtü toprağının örtülmesini takip eden ilk 5 gün içerisinde 35-40 adet sinek görülmeye başladığında mücadele yapılır.
-Rufast 75 EW örtü toprağına uygulanmalıdır. Tek uygulama yeterlidir.
-Uygulama örtü toprağının serilmesini takip eden 5.-7. günler arasında yapılmalıdır.

Pamukta Tütün Tripsi: Pamuk fidesi 1-3 gerçek yapraklı dönemde iken zararlı popülasyonunu, yaprak başına 1 adet (nimf veya ergin) düzeyine geldiğinde tripse karşı mücadele yapmak gerekir.

Pamukta Kırmızı Örümcek: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı dönemde sayımlara başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarlarında içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kesimler ilaçlanmalıdır. Yaprak başına Akdeniz Bölgesinde 5, Ege ve Güneydoğu bölgesinde 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

Bağ Tripsleri: Bağda ilkbaharda gözler uyanmaya başlayıp, ilk yapraklar görüldüğünde zararlı popülasyon yoğunluğu en az 2-3 trips ergin veya larva/yaprakçık olarak saptandığında uygulama yapılmalıdır. Asmanın yeşil aksamının tümüne uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Bir uygulama yeterlidir.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

Rufast 75 EW adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre 3A grubu olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Rufast 75 EW'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (3A grubu harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK:

Rufast 75 EW genel olarak tek başına kullanılır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

FMC

RUFAST® 75 EW

EMULSİYON SUDA YAĞ (EW)

| | | |
|-------|----|---|
| Grubu | 3A | Insektisit-Akarisit (Böcek ve Kırmızı Örümcek İlacı) |
|-------|----|---|

75 g/l Acrinathrin

Göz ile temas: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını akan bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkarın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutma: Ağız iyice yıkayın. Bol su içirin. Hastayı kusturmaya zorlamayın. Bilinç yerinde değil ise ağızdan bir şey vermeyiniz. Ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Spesifik bir tedavi şekli yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız. Gastrik lavaj ve / veya aktiveleştirilmiş odun kömürü ile idare olarak kabul edilebilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



16-02-2023

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ilaçların kalitesini garanti eder; fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ FİRMA:

Cheminova A/S Thyboronvej 78, DK-7673
Harboore / Danimarka

Üretim Tesisi:

Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG
Stader Elbstrasse 28, 21683 Stade / Almanya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/Istanbul
Tel: 0 216 900 24 81
Faks: 0 216 900 24 82
Acil durum tel. (Chemtrec) : 0 212 705 53 40

FMC

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
MERSİS No: 0388082946000001

Dr. Murat KAHYAOĞLU
Teknik Müdür

f x