

İmal tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve numarası:

KULLANILACĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Kontrol Edilen Yabancı Ot	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Granstar Toleranslı Ayçiçeği Çeşitleri	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>), Horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Çoban değneği (<i>Polygonum aviculare</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4 g/da + 25 ml/da Trend 90	-

Zipstar® kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancıotlar tarafından bünyelerine alınır. Topraktaki kalıcı etkisi kısadır. Hassas yabancıotların büyümesi uygulamadan kısa süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri büyüme şartlarına, yabancıotların hassasiyetlerine bağlı olarak uygulamadan 1-3 hafta sonra görülür. Uygulamadan sonra 3 saatlik yağışsız süre yabancıot kontrolünün en yüksek seviyede olması açısından önemlidir. Zipstar® Granstar'a toleranslı ayçiçeği çeşitlerinde yabancıot mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancıot ilacıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaç su deposuna ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinenin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLENMESİ:

ilaçlama işlemi tamamlandıktan hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

FMC

Zipstar®

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grup	B	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
------	---	-----------------------------

%56,25 Tribenuron methyl + %18,75 Thifensulfuron methyl

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ,
ÇOCUKLARDAN GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ,
BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Yutulması halinde: Gargara yapın (yaptırın). Sorun olması durumunda, tıbbi yardım alın.

Gözle teması halinde: Gözleri hemen musluk suyu ile yıkayın, göz kapaklarını açın (gerekirse kuvvet kullanın); varsa, etkilenen kişinin kontak lenslerini hemen çıkarın. Durulama en az 10 dakika devam etmelidir.

Deriyle teması durumunda: Kirlenmiş kıyafetleri çıkarın. Etkilenen bölgeyi bol ve mümkünse ılık su ile yıkayın. Cilt yaralanması yoksa sabun, sabun çözeltisi veya şampuan kullanılmalıdır. Cilt tahrişi devam ederse tıbbi tedavi başlatın.

Solunması halinde: Hemen maruz kalma durumunu sonlandırın ve etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarın. Kişiyi artan soğumaya karşı koruyun. Tahriş, solunum güçlüğü veya diğer semptomlar devam ederse tıbbi tedavi başlatın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Tribenuron methyl

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P101 Tıbbi yardımın gerekli olması halinde ürün konteynerini veya etiketini alın.
P102 Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.
P280 Koruyucu eldiven kullanın
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.
P391 Döküntüleri toplayın
P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sulara bulaştırmayınız.
- Depolama veya atık imhası sırasında sulara, gıda maddelerine ve yemlere bulaştırmayınız.
- Gübre, insektisit ve tohumlardan ayrı yerde depolayınız.
- Ambalajını yeniden kullanmayınız.
- Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya ilacın taşınarak ya da yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz.
- ilaçlama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasını mani olunuz. Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

® FMC'nin tescilli markasıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

05 Temmuz 2022

FMC
FMC TİM ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
Nispetiye Sok. No: 1
Nispetiye Mahallesi Kuzey Kat: 15/149
Atasehri / İST. YENİKAPI V.D. 3880829400
MERSİS NO: 0388082946000001

Dr. NESTİN ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içerisinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir. Zipstar® tabikat zamanı açısından büyük esneklik sağladığından, uygulama zamanı, problem olan yabancıotların büyüme devrelerine göre tesbit edilir. En iyi retice tabikat, yabancıotlar en az iki yapraklı devrede iken ancak, 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancıotların üstü hububat tarafından kapatılmadan yapıldığında alınır.

Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden Zipstar®'ı anormal hava şartları ve kuraklık nedeniyle baskıya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.

Zipstar®'ı bir sezonda aynı yerde bir defadan fazla uygulamayınız.

FİTOKSİSİTE:

Zipstar® tavsiyeye uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir.

GRANSTAR TOLERANSLI AYÇİÇEĞİ ÇEŞİTLERİ:

Uygulama ayçiçeğinin 4-6 yapraklı olduğu dönemde, yabancı otların da erken gelişme dönemi olan 2-4 yapraklı veya 15 cm yükseklikte ve çapa ulaşmadan önceki dönemlerinde yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze tipi püskürtme yapan memeler kullanılmalıdır. Dekara 40 L su kullanılması önerilmektedir. Uygulamanın; 25 ml/da dozunda Trend® 90 (yayıcı yapıştırıcı) ile tank karışımı şeklinde yapılması gerekmektedir.

Uygulama yapmadan önce, Granstar toleranslı ayçiçeği çeşitleri için FMC temsilcisine danışınız.

ÜRÜN MÜNAVEBESİ:

- Granstar Toleranslı Ayçiçeği Çeşitlerinin ekildiği tarlaların bozulması durumunda, Zipstar® uygulamasından sonra 1 ay içerisinde sadece Granstar toleranslı ayçiçeği çeşitleri, yazlık hububat ya da mısır ekiniz. Bu ürünlerin ekiminden önce toprak en az 15 cm derinlikte sürülerek işlenmelidir.
- Zipstar® ile ilaçlanmış Granstar toleranslı ayçiçeği çeşitlerinin hasatından sonra aynı takvim yılında sadece hububat, tarla fasulyesi, keten, kolza, bakla, bezelye, patates, şekerpancarı, mısır ve ayçiçeği ekilebilir. Ancak, sebze fidesi ya da süs bitkilerinin ekilip/dikilmesi planlanıyorsa kısıtlamalarla ilgili olarak FMC temsilcilerine danışınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Zipstar® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Zipstar®'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Genel olarak bütün dozlarda yayıcı yapıştırıcı kullanılabilir. Bu, Zipstar®'ın bazı yabancıotlar üzerindeki etkisini arttırabileceği gibi etkinin daha çabuk ortaya çıkmasına da neden olacaktır. Zipstar®'ın diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

FMC

Zipstar®

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grup	B	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
------	---	-----------------------------

%56,25 Tribenuron methyl + %18,75 Thifensulfuron methyl

FİRMA BEYANI :

FMC bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zarar, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ilaçla tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

Ruhsat Sahibi Firma:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/İstanbul
Tel: 0 216 900 24 81
Faks: 0 216 900 24 82
Acil durum tel. (Chemtec): 0 212 705 53 40

Üretici Firma:

FMC International Switzerland Sàrl
Chemin des Blandonnet 8
1214 Vernier İsviçre

Üretim Tesisi:

FMC France S.A.S
23 Rue de la Scierie
68700 Uffholtz, Fransa


Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

© FMC'nin tescilli markasıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

05 İZMİR 2022


FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI Y.D. 3880829460