

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Domates (sera)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	75 ml/100 L su	7

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan METIKOLOS® önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates Mildiyösi:

Uygulamalara, çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. Her yıl hastalığın görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında ise hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce yapılmalıdır. Hastalığın gelişimine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamalara devam edilmelidir. Uygulamalar özellikle yaprak altları olmak üzere bitkinin tüm kısımlarını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. Domateste mildiyöye karşı METIKOLOS® ile sezonda en fazla 2 uygulama yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

23 Aralık 2024

FMC METIKOLOS® SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	C5:29	U:27	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-------	------	-------------------------

(300 g/L Fluazinam + 200 g/L Cymoxanil)

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü uygulanmış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin). Zehirlenme belirtileri birkaç saat sonra bile ortaya çıkabilir; bu nedenle kazadan sonra en az 48 saat tıbbi gözetim gereklidir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Hastayı sıcak tutarak doktora gidiniz. İlaç ve etiketini birlikte götürünüz.

Solumum: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun. Bilinç kaybı durumunda hastayı nakil için sabit yan pozisyona getirin.

Deri ile temas: Anında su ve sabunla yıkayın ve iyice durulayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun. Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları yeniden kullanmadan veya atmadan önce temizleyin.

Göz ile temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Kirlenmiş su ile etkilenmemiş gözü durulamamaya dikkat edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICA
Daire Başkanı
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICA
Daire Başkanı

® FMC'nin tescilli markasıdır.

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

Ek-1

İÇİNDEKİLER:
Fluazinam, Cymoxanil içerir.

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H361fd Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çöl hasara yol açma şüphesi var.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organ hasara yol açabilir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P263 Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçınınız.
P280 Korumaya eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yağ P391 Döküntüleri toplayın.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.
SP1 Ürün veya kabı ile suyu kirliletmeyin.
P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLE HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı sularına ve su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Ürün atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalıklarına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha.
- Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanma usulüne uygun imha edin.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmamış depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişim olmaz.

FMC
FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule, Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir/İST. TİC. KAYIT NO: 3880829460
MERSİS NO: 388082946000001

Durmuş DEMİR
Şirket Vekili

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

METIKOLOS® adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grubu C5;29 ve U:27 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için METIKOLOS®'u aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C5;29 ve U:27 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.

FMC
METIKOLOS®
 SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)


Grubu	C5:29	U:27	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-------	------	-------------------------

(300 g/L Fluazinam + 200 g/L Cymoxanil)

Yutma: Hemen doktora başvurun. KUSTURMAYIN. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Kusma kendiliğinden olabilir. Yutulan ürünün aspirasyonunu önlemek için kişiye yan yatırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Hastada gözlenen belirtiler değerlendirilerek uygun tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114



® FMC'nin tescilli markasıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 KABUL EDİLMİŞTİR

FİRMA BEYANI:

FMC bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğu normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti etmektedir. İlacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları karşılamak mümkün değildir. Mahsül zararı, tesirsizlik ve istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi madde bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama kılavuzundaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. RİSKLER ALICI TARAFINDAN KABUL EDİLECEKTİR. FMC BU İLAÇI YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLİR SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

Üretici Firma:

SIPCAM OXON SpA - Via Sempione,
 195, 20016 Pero (MI) - İtalya

Üretim Yeri: SIPCAM OXON SpA - Via Vittorio Veneto 1
 26857 Salerano sul Lambro (LO) - İtalya

Ruhsat Sahibi

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
 Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
 Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
 Ataşehir/İstanbul
 Tel: 0 216 900 24 81
 Faks: 0 216 900 24 82
 Acil durum tel. (Chemtrec): 0 212 705 53 40

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
 Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
 Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
 Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
 MERSİS No: 0388082946000001

Durmuş DEMİREL
 Şirket Vekili

23 Aralık 2024