

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.: 30.06.2015/10299

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre (gün)
Bağ*	Bağda Külleme (<i>Erysiphe necator</i>)	50 ml/100 l su	14
	Bağda Mildiyö (<i>Plasmopora viticola</i>)	50 ml/100 l su	14
Domates (sera)	Patlıcangillerde Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	50 ml/100 l su	3
Biber (sera)	Patlıcangillerde Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	50 ml/100 l su	3
Fındık	Fındıkta Külleme (<i>Erysiphe spp.</i>)	30 ml/da	28
Buğday	Buğday sarı pas (<i>P. striiformis</i>)	30 ml/da	56
	Septorya Yaprak Lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	30 ml/da	56
	Külleme (<i>Erysiphe graminis f.sp tritici</i>)	30 ml/da	56
Çeltik	Çeltik yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	30 ml/da	56
	IHA ile Uygulama**	30 ml/da	
Karpuz	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>)	50 ml/da	14
	Kabakgillerde Alternaria yaprak yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)		
Antepfıstığı	Antepfıstığında karazenk (<i>Pseudocercospora pistacina</i>)	50 ml/100 l su	28
Şekerpancarı	Yaprak leke hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	30 ml/da	56
Yerfıstığı	Cercospora Yaprak Leke Hastalığı (<i>Cercospora arachidis</i>)	50 ml/da	14

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 Ocak 2025

FMC TOPGUARD® EQ SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	C3: 11	G1: 3	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	--------	-------	-------------------------

296 g/l Azoxystrobin + 218 g/l Flutriafol

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünüyü uygulanmış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Ağız dolusundan daha az miktarlarda yutulduğunda mide bulantısı, kusma ishal gibi gastrointestinal rahatsızlıklara, yüksek dozlarda yutulduğunda tansiyonun düşmesine, deriden emilimi ya da solunum maruziyeti sonucu toksik dozun miktarına göre baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik, tansiyon düşmesine akciğer ödemeine neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Hastayı sıcak tutarak doktora gidiniz. İlaç ve etiketini birlikte götürünüz.

Solunum: Hafif durumlarda temiz havaya çıkarın belirtiler görülürse tıbbi yardım alın. Personeli temiz havaya çıkarınız. Ciddi durumlarda hemen doktorla temasa geçin ve ambulans çağırın.

Deri ile temas: Cildi derhal bol su ve sabunla yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkartın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın. Tahriş olursa tıbbi yardım alın.

Göz ile temas: Gözleri derhal bol su ya da göz yıkama solüsyonu ile göz kapakları açık bir şekilde kimyasal madde tamamen arıncaya kadar yıkayın; varsa kontak lensleri çıkartın, yıkamaya bir süre daha devam edin. Tercihen bir göz doktorundan gecikmeden yardım alın.

N. Akar
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

® FMC'nin tescilli markasıdır.

Net miktarı :
Azami perakende satış fiyatı:

Ek-1

İÇİNDEKİLER:

Azoxystrobin, Flutriafol içerir.

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Korumaya eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P391 Döküntüleri toplayınız.

P501 İçeriği/kabı bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

EUH208 Alerjik reaksiyona yol açabilir.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLE HUSUSLAR

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.

-Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını bulandırmayınız.

-Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır

-Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilacı hazırlamayınız.

-Hazırlanan ilacın direkt güneş ışığından korunması gerekir.

-İlacın kullanma ve içme sularına karışmasına mani olunur.

-Ürün suda yaşayan organizmalar için tehlikelidir ve ortamlarda ters etkilere sebebiyet verebilir. Ambalajları/boyutları çevreye, göl ve akarsulara, kanalizasyona atılmamalıdır.

yetkili mercilere teslim ediniz

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişim olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilacın kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilacının depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler nedeniyle vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.

Barbaros Mah. Beğonya Sok. No:3

Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149

Ataşehir / 35500 BEŞİKÖZ / İZMİR T.C. 3880829460

MERSİS No: 38808294600001

Durmuş DE
Şirket Var

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Topguard EQ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

****İnsansız Hava Araçları ile Uygulama Şekli:** 1,6-1,8 bar basınçta, 3,69 Km/h ilerleme hızında, 2,6 m uçuş yüksekliğinde, toplam 800 ml/dk meme verdisi ile 5 l/da ilaç normu kullanılarak İHA ile ilaçlama yapılmalıdır. Uygulamalarda sürüklenme riskine karşı, iş genişliğine bağlı olarak en az 4 m emniyet şeridi bırakılmalı ve tercihen sürüklenmeyi azaltan (anti-drift) memeler kullanılmalıdır. Hassas alan ve su kaynakları yakınında yapılan ilaçlamalarda en az 30 m emniyet şeridi bırakılmalıdır. İHA ile ilaçlamalarda 2 m/s nin üzerindeki rüzgar hızlarında uygulama yapılmamalıdır. Uygulamadan önce kalibrasyon yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**Bağ Küllemesi:**

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
- 4 ve diğer Uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ Mildiyözü:

1. Uygulama sürgünler 25-30 cm olunca,
2. ve daha sonraki uygulamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 10-12 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca uygulamaya son verilir.

Domates (sera) Patlıcangillerde Külleme:

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanır. Hastalık şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Biber (sera) Patlıcangillerde Külleme:

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanır. Hastalık şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

FMC

TOPGUARD® EQ

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	C3: 11	G1: 3	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	--------	-------	-------------------------

296 g/l Azoxystrobin + 218 g/l Flutriafol

Yutma: Ağız yoluyla hiçbir şey vermeyin. Ağız su ya da süt ile çalkalayın. Kusturmayın, kusmasına izin vermeyin. Eğer kusarsa ağız tekrar su veya süt ile çalkatın. Hemen doktor çağırın ve/veya acil yardıma sevk edin. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Hastada gözlenen belirtiler değerlendirilerek uygun tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Dr. Nesrin ÇAKIR-ARIOĞAN
Daire Başkanı

Üretim Tesisi (Fabrika):

PHYTEUROP

Rue Pierre My, Z.I. Grande Champagne, 49260 MONTRÉBELLAY, Fransa

Üretici Firma:

CHEMINOVA A/S

Thyboroenvej 78 DK-7673 Harboøre, Danimarka

Ruhsat Sahibi

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.

Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3

Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149

Ataşehir/İstanbul

Tel: 0 216 900 24 81

Faks: 0 216 900 24 82

Acil durum tel. (Chemtrec) : 0 212 705 53 40

FMC

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880629460
MERSİS No: 0388082946000001

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

13 Ocak 2025 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

® FMC'nin tescilli markasıdır.

Fındıkta Külleme:

Erysiphe spp.'nin neden olduğu külleme hastalığı bahçede ilk defa görülüyorsa ise belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde uygulamaya başlanır. İklim koşulları ve ilacın etki süresine bağlı olarak ikinci ve diğer uygulamalara hasada kadar devam edilir. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

Buğday pas hastalığı: ilaçlı mücadele pas püstüllerinin ilk görülmeye başladığı zamanda yapılmalıdır. İlaçlama aleti olarak kullanılan tarla pülverizatörleri en az 2.1 bar basınçla çalıştırılmalı ve dekara en az 25 litre su atılmalıdır.

Buğday Septorya Yaprak Lekesi: İlk hastalık belirtileri görüldüğü zaman 1. ilaçlama, gerektiğinde veya iklim şartlarının hastalığın seyri için uygun olduğu durumlarda 1. ilaçlamadan 22-28 gün sonra ise 2. ilaçlama yapılmalıdır.

Buğday Külleme hastalığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğü zaman ilaçlama yapılmalıdır.

Çeltik yanıklığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde veya hava koşulları hastalık gelişimine uygun seyreliyorsa ilk uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın gelişimi takip edilerek gerek görüldüğünde 2. uygulama yapılabilir.

Karpuzda Kabakgillerde Külleme: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak uygulamaya 10 gün ara ile devam edilir. Bitkinin yeşil aksamını kapsayacak şekilde, havanın serin ve rüzgarsız olduğu zamanlarda uygulama yapılmalıdır. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı nemin %50 olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

Kabakgillerde Alternaria yaprak yanıklığı: Gerek fideliklerde gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın seyrine uygun olduğunda 12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilmelidir.

Antepfıstığı karazenk:

1. ilaçlama: ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde, 2. ve diğer ilaçlamalar: ekolojik koşullar ve hastalığın seyrine göre 14 gün aralıklarla yapılır.

Şekepancarı Yaprak Leke hastalığı: İlaçlamalara hastalık için uygun hava şartları oluştuğunda ve tarlada yapraklar üzerinde ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanır. Hastalığın seyrine göre kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir. Hastalığın seyrine bağlı olarak 10-14 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Yerfıstığında Cercospora Yaprak Leke Hastalığı: Uygulamaya ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle başlanır. Hastalık belirtileri ortadan kalkıncaya kadar 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Hasat ile son ilaçlama arasındaki süreye dikkate edilmelidir.

Topguard® EQ ile sezon içinde aynı yerde 2'den fazla uygulama yapmayınız.

FMC

TOPGUARD® EQ

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	C3: 11	G1: 3	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	--------	-------	-------------------------

296 g/l Azoxystrobin + 218 g/l Flutriafol



FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
MERSİS No: 0388082946000001

Durmuş DEMİREL
Şirket Yetkilisi



® FMC'nin tescilli markasıdır.

13 Ocak 2025 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Topguard® EQ adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grubu C3;11 ve G1;3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Topguard® EQ'yu aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3;11 ve G1;3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.

FMC
TOPGUARD® EQ
 SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	C3: 11	G1: 3	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	--------	-------	-------------------------

296 g/l Azoxystrobin + 218 g/l Flutriafol

FMCTURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
 Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
 Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
 Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
 MERSIS No: 0388082946000001

Durmuş DEMİREL
 Şirket Vekili

Dr. Neşrin ÇAKIR ARICAN
 Daire Başkanı

® FMC'nin tescilli markasıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 KABUL EDİLMİŞTİR
 13 Ocak 2025