



An Agricultural
Sciences Company



DEBUT®

Herbisit

TIVMETIX® 500 SC

Herbisit

**ŞEKER PANCARI YABANCI OT
MÜCADELESİNDE MUHTEŞEM İKİLİ**



ag.fmc.com/tr

[f/fmcturkey](https://www.facebook.com/fmcturkey)

[ig/fmcturkey](https://www.instagram.com/fmcturkey)

[y FMC Turkey](https://www.youtube.com/channel/UCFMC_Turkey)

[in FMC Turkey](https://www.linkedin.com/company/fmc-turkey)

Bitki koruma ürünlerini güvenli şekilde kullanınız. Bitki koruma ürünlerini uygularken daima ürün etiketini takip ediniz.





An Agricultural
Sciences Company

DEBUT® - TIVMETIX® 500 SC

Herbisit

Debut®

Aktif maddesi: %50 Triflusufluron methyl
Formülasyonu: Suda Dağılıbilir Granül (WG)

Özellikleri:

- Düşük dozlarda etkindir.
- Tavsiyelere uygun kullanıldığında şeker pancarı bitkisinde fitotoksisteye sebep olmaz.
- Şeker pancarında farklı etki mekanizmalı yabancı ot ilaçları ile tank karışımı olarak veya bir ilaçlama programı dahilinde beraber kullanılabilir.

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanım Dozu
Şeker pancarı	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Papatya (<i>Matricaria spp.</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Kolza (<i>Brassica napus</i>)	3g/da+20ml/da Trend® 90*



Yabani Hardal
(*Sinapis arvensis*)



Papatya
(*Matricaria spp.*)

*Debut® mutlaka beraberinde verilen yayıcı yapıştırıcı Trend® 90 ile kullanılmalıdır.
Trend® 90'ın dozu dekara 20 ml'dir.

Uygulama Zamanı: Bir hafta araya iki uygulama yapılmalıdır. İlk uygulama, yabancı otların çıkışından sonra yabancı otların erken gelişme dönemlerinde (2-4 yaprak) kaplama ilaçlama şeklinde yapılmalıdır. İkinci uygulama ise ilk uygulamadan bir hafta sonra yapılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız hava koşullarında yapılmalıdır.



Adi Yavşan Otu
(*Veronica hederifolia*)



Kolza
(*Brassica napus*)

Tivmetix® 500 SC

Aktif maddesi: 500 g/l Lenacil
Formülasyonu: SC (Akıcı Konsantr/Süspansiyon Konsantr)

Özellikleri:

- Fotosentez inhibitörü olarak etki göstermektedir.
- Şeker pancarında farklı etki mekanizmalı yabancı ot ilaçları ile tank karışımı olarak veya bir ilaçlama programı dahilinde beraber kullanılabilir.

Uygulama Zamanı: Şeker pancarının 2-4 gerçek yaprak olduğu dönem itibarıyla, yabancı otların çıkışından sonra yabancı otların erken gelişme dönemlerinde (2-4 yaprak) kaplama ilaçlama şeklinde yapılmalıdır.



Bitki Adı	Kontrol Edilen Yabancı Ot	Uygulama Dozu
Şeker pancarı	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Serçe dili (<i>Stellaria media</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	1.Uygulama yabancı otlar 2-4 yapraklı dönemdeyken 25 ml/da 2.Uygulama 1.Uygulamadan 7 gün sonra 25 ml/da 3.Uygulama 2.Uygulamadan 7-10 gün sonra 50 ml/da



Yabani Hardal
(*Sinapis arvensis*)



Gelincik
(*Papaver rhoeas*)



Serçe dili
(*Stellaria media*)



Sirken
(*Chenopodium album*)

Debut® +Trend® 90+ Tivmetix® 500 SC

