



An Agricultural
Sciences Company



STARLIGHT®

Insektisit-Akarisit

**KALINTI BIRAKMAYAN,
EŞSİZ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ İLE
BİTKİLERİNİZİ KORUMA ALTINA ALIN!**

ag.fmc.com/tr

[f/fmcturkey](https://www.facebook.com/fmcturkey)

[ig/fmcturkey](https://www.instagram.com/fmcturkey)

[yt FMC Turkey](https://www.youtube.com/FMCTurkey)

[in FMC Turkey](https://www.linkedin.com/FMCTurkey)

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Bitki koruma ürünlerini uygularken daima ürün etiketini takip ediniz.





An Agricultural
Sciences Company

STARLIGHT®

İnsektisit-Akarisit

Aktif maddesi: Parafinik Yağ 800 g/l

Formülasyonu: Emülsiyon Konsantre (EC)

Eşdeğer n-parafin medyan karbon numarası: nC23

Kükürttten ari kalıntı: En az %98


Özellikler :

- Her damlacıktan gelen olağanüstü kaplama gücü, **zararlı solunumunu ve yumurtlamasını** (yumurta bırakmasını) engelleyerek parafinik yağın fiziksel etkisini en üst düzeye çıkarır.
- Birçok faydalı böceğe karşı daha güvenli olarak zararlılarda yeni nesilleri baskıladığı için **ideal bir Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) bileşenidir**.
- Zararlıların **direnç yönetiminde** mükemmel rotasyon seçeneği sunar.
- Karıştığı insektisitlerin etki alanını, yayılma ve ıslatma özelliğini artırarak **yardımcı madde görevi** görür.
- Yüksek parafinik nC23** baz yağından dolayı **fitotoksisite riski düşüktür**.
- Üstün bir **homojen tank karışımı** için suda kolayca emülsifiye olur.
- Biyolojik olarak parçalanabilen, emülgatörlerle formüle edilmiştir. **Bitkide ve çevrede kalıntı bırakmaz**.
- Suyla durularak **kolayca temizlenir**.

Starlight®, Bitkisel Üretimde Parafinik Yağı teknolojisini üst seviyeye taşıyor. **Starlight®'ın yüksek yayılma teknolojisi**, yaprakları, meyveleri ve zararlıları **hızlı, eşit ve tamamen kaplamasını sağlar**. Bu sayede, bitkilerin üzerindeki Armut Psillidi, Dut kabuklubiti, San Jose kabuklubiti, Turunçgil kırmızı kabuklubiti ve Kırmızı örümcekler gibi çeşitli zararlılara karşı daha güçlü bir mücadele gösterir.

Hiper Kaplama Teknolojisi

Parafinik yağların fiziksel etki mekanizması **iyi bir kaplamaya** bağlıdır. Aşağıdaki görsellerde; "diğer parafinik yağ" ile **"Starlight®"** 'ın bir yaprağın yüzeyine iki damlacık olarak damlatılmasının ardından nasıl yayıldığı gösterilmektedir.



"Starlight®", yaprağın tamamının eşit miktarda parafin ile kaplanmasını sağlar, böylece yoğun damlacıkların oluşturabileceği "fotosentezin engellenmesi" ve "fitotoksisite" gibi sorunların oluşmasını önler."

Bitki Adı	Zararlı Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Armut	Armut Psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	1,5 L / 100 L su
Şeftali	Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	3 L / 100 L su (Kış Uygulaması)
Elma	San Jose kabuklubiti (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	2,5 L / 100 L su (Kış Uygulaması)
Hıyar (Sera)	Kırmızı örümcekler (<i>Tetranychus cinnabarinus</i> , <i>Tetranychus urticae</i>)	800 mL / 100 L su
Turunçgiller	Turunçgil kırmızı kabuklubiti (<i>Aonidiella aurantii</i>)	1,5 L / 100 L su