



An Agricultural
Sciences Company

Savora®

Herbisit

TEKNİK BÜLTEN



Savora® Herbisitine Genel Bakış


Aktif maddesi: 300 g/L Pethoxamid + 187,5 g/L Terbuthylazine

Formülasyonu: Suspo-Emülsiyon (SE)

Savora®, pamuk, mısır ve ayçiçeğinde hem dar hem de geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde, ekim sonrası çıkış öncesi kullanılan yeni **nesil bir herbisittir**. İçeriğinde bulunan iki aktif maddenin oluşturduğu sinerji sayesinde kontrolü zor yabancı otlara karşı güçlü bir mücadele sağlar.

Pethoxamid, FMC tarafından geliştirilen, dar ve geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde etkili ve uzun süreli koruma sağlayan sistemik bir herbisittir. Küresel anlamda **Pethoxamid'in** etkili olduğu yabancı ot gruplarında, dayanıklılık kazanmış bir tür tespit edilmemiştir.

Terbuthylazine; Triazine grubuna ait, sistemik bir herbisittir. Yabancı otlar tarafından alım genellikle kökler ve koleoptilden olur. Kontrolü zor olan birçok geniş ve dar yapraklı yabancı otları kontrol altına alır.



SAVORA®'NİN BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ



UZUN SÜRELİ ETKİ

Uzun süreli yabancı ot kontrolü sağlar.



DİRENÇ YÖNETİMİ

Dayanıklılık yönetimi programlarına uygundur.



GENİŞ SPEKTRUM

Dar ve geniş yapraklı birçok yabancı ot türüne karşı etkilidir.



GÜVENLİ KULLANIM

Mısır, ayçiçeği ve pamuk bitkileri için son derece güvenlidir.



YÜKSEK VERİM

Erken kullanım dönemi sayesinde yabancı otlar kültür bitkisi ile rekabete giremez.

Tüm topraktan etkili herbisitlerde olduğu gibi, **Savora®**'dan da istenilen en iyi sonuçların alınabilmesi için;



İyi bir toprak işlenmesi yapılmalıdır.



Dekara 30-40 litre su ile ilaçlama yapılmalıdır.



Toprak tavında ve keseksiz olmalıdır.



İmkan dahilindeyse, ilaçlama yapıldıktan sonra yağış yoksa 20 - 30 mm yağmurlama ile sulama yapılmalıdır.



Yelpaze hüzmeli meme tercih edilmelidir.



Ayrıca, kum içeriği yüksek, hafif topraklarda ve salma sulama yapılan alanlarda kullanılmamalıdır.

SAVORA®

Herbisit

Uygulama Tavsiyesi:

Mısır ekimi yapıldıktan sonra; mısır ve yabancı otlar çimlenip toprak üzerine çıkmadan önce toprak ilaçlaması şeklinde ya da yabancı otlar 2-4 yaprak olduğu dönemde ve erken çıkış sonrası uygulama yapılmalıdır.

Savora®



Tüm topraktan etkili herbisitlerde olduğu gibi **Savora®** 'dan istenilen en iyi sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalıdır. Toprak tavında ve keseksiz olmalıdır. Uygulamalardan en iyi sonucu almak amacıyla yelpaze hüzmeli meme tercih edilmeli ve dekara 30-40 litre su ile ilaçlama yapılmalıdır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki	Kontrol Edilen Yabancı Otlar	Kullanım Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Mısır	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Sürünücü horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Yapışkan otu (<i>Setaria verticillata</i>)	400 ml/da çıkış öncesi	56 gün
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrasti</i>) San taş yoncası (<i>Melilotus officinalis</i>) Dev horozibiği (<i>Amaranthus palmeri</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	300 ml/da çıkış sonrası	



Sirken
(*Chenopodium album*)



Yapışkan Otu
(*Setaria verticillata*)



Darıcan
(*Echinochloa crus-galli*)



Semizotu
(*Portulaca oleracea*)



Dev horozibiği
(*Amaranthus palmeri*)



Kırmızı köklü tilki kuyruğu
(*Amaranthus retroflexus*)



Herbisit

Uygulama Tavsiyesi:

Pamuk ekimi yapıldıktan sonra; pamuk ve yabancı otlar çimlenip toprak üzerine çıkmadan önce toprak ilaçlaması şeklinde yapılmalıdır.



Tüm topraktan etkili herbisitlerde olduğu gibi **Savora®** 'dan istenilen en iyi sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalıdır. Toprak tavında ve keseksiz olmalıdır. Uygulamalardan en iyi sonucu almak amacıyla yelpaze hüzmeli meme tercih edilmeli ve dekara 30-40 litre su ile ilaçlama yapılmalıdır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki	Kontrol Edilen Yabancı Otlar	Kullanım Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli Darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)	400 ml/da çıkış öncesi	70 gün



Topalak
(*Cyperus rotundus*)



Köpek üzümü
(*Solanum nigrum*)



Darıcan
(*Echinochloa crus-galli*)



Semizotu
(*Portulaca oleracea*)



Şeytan elması
(*Datura stramonium*)



Horoz İbiği
(*Amaranthus albus*)



Kırmızı köklü tilki kuyruğu
(*Amaranthus retroflexus*)



SAVORA®

Herbisit

Uygulama Tavsiyesi:

Ayçiçeği ekimi yapıldıktan sonra; ayçiçeği ve yabancı otlar çimlenip toprak üzerine çıkmadan önce toprak ilaçlaması şeklinde yapılmalıdır.



Tüm topraktan etkili herbisitlerde olduğu gibi **Savora®** 'dan istenilen en iyi sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlenmesi yapılmalıdır. Toprak tavında ve keseksiz olmalıdır. Uygulamalardan en iyi sonucu almak amacıyla yelpaze hüzmelili meme tercih edilmeli ve dekara 30-40 litre su ile ilaçlama yapılmalıdır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki	Kontrol Edilen Yabancı Otlar	Kullanım Dozu
Ayçiçeği	Yabani Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Bozot (<i>Heliotropium europaeum</i>) Yatık Sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>)	400 ml/da çıkış öncesi



Sirken
(*Chenopodium album*)



Yabani Hardal
(*Sinapis arvensis*)



Bozot
(*Heliotropium europaeum*)



Yatık Sirken
(*Chenopodium vulvaria*)



KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki	Kontrol Edilen Yabancı Otlar	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Mısır	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Sürünücü horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Yapışkan otu (<i>Setaria verticillata</i>)	400 ml/da çıkış öncesi	56 gün
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrastii</i>) Sarı taş yoncası (<i>Melilotus officinalis</i>) Dev horozibiği (<i>Amaranthus palmeri</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	300 ml/da çıkış sonrası	
Pamuk	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli Darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)	400 ml/da çıkış öncesi	70 gün
Ayçiçeği	Yabani Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Bozot (<i>Heliotropium europaeum</i>) Yatık Sirken (<i>Chenopodium vulvaria</i>)	400 ml/da çıkış öncesi	---

®FMC'nin tescilli markasıdır.

ag.fmc.com/tr/tr

f/fmcturkey

@/fmcturkey

▶ FMC Turkey

in FMC Turkey

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz. Yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.

UZEM (Ulusal Zehir Merkezi) Tel: 114

Herhangi bir zehirlenme veya diğer acil durumlarda aşağıdaki Chemtrec numarasını arayarak yardım alabilirsiniz.

CHEMTREC: 0212 705 53 40 (24 saat)

