



An Agricultural
Sciences Company

FMC'NİN YENİ YILDIZI TARLALARA BEREKET GETİRİYOR!



**FMC**An Agricultural
Sciences Company

FOLY™ AA

Hayvansal Menşeli Amino Asit İçeren Sıvı Organik Gübre

Hayvansal Menşeli Amino Asit İçeren Sıvı Organik Gübre

OM	C	N	Serbest AA
%39	%17	%4,2	%24

Foly™ AA, bitki tarafından hızlı bir şekilde alınabilen çok yüksek miktarda serbest amino asit (% 24) içeren ayrıca içeriğinde bulunan birçok esansiyel amino asitler (Ac. Glutamik, Prolin, Glisin vb.) ile bitkinin her döneminde kullanılmaya uygun bir hayvansal amino asittir.

Foly™ AA, hayvansal menşeli bir amino asit olarak; bitki metabolizmasını hızlandırır ve bitkinin tüm stres koşullarına karşı bitkiyi daha dayanıklı hale getirir. Birlikte verilen besin elementlerinin etkinliğini artırır. Bitki tarafından hızlı bir şekilde alınabilir yüksek serbest amino asit içeriğine sahip **Foly™ AA**, içeriğinde 18 farklı L-α-amino asit bulundurmaktadır. İçeriğindeki esansiyel amino asitler (Ac. Glutamik, Prolin, Glisin vb.) yüksek orana sahip olup, bitkinin her fenolojik aşaması için kullanımı uygun olan bir destekleyicidir.

- Gelişiminin ilk aşamalarında bitkinin büyümesini uyarır.
- Stomaların açılmasını teşvik eder.
- Bitkinin önemli fizyolojik süreçlerinde önemli rol oynar.
- Polenlerin çimlenme gücünü artırır.
(Polen tüpünün üretimini ve uzamasını teşvik eder.)
- Protein sentezini (enzimler, hücre zarlarıyla ilişkili proteinler vb.) destekler.
- Stresli durumlarda bitkilerde su dengesinin düzenlenmesinde rol oynar. Kurak koşullarda bitkiye destek olur.
- Bitkinin stres koşulları altında bile daha iyi performans göstermesini sağlayarak, kaliteli ve verimli ürün elde edilmesi destekler.
- Fotosenteze yardımcı olur.
- Klorofil artırıcı etkisi ile fotosentez desteklenir.
- Azotun bitki tarafından alınımını teşvik eder ve rezervine yardımcı olur.
- Özellikle katyon üzerinde şelatlama etkisi vardır. Dolayısıyla verilen besleme ürünlerinin alınımını kolaylaştırır.
- Fitohormonların oluşumunu (oksinler, sitokininler, etilen, porfirinler vb.) destekler.
- Bitki gelişimi için gerekli olan katyon moleküllerinin düzenlenmesinde rol oynar.

Önerilen bazı kullanım dönemleri:

Ürün ve Ürün Grubu	Uygulama Zamanı	Faydaları
 Buğday	Kardeşlenme dönemi, sapa kalkma dönemi, bayrak yaprak	Kardeşlenmeyi artırır, güçlü sap ve dolgun tane oluşumu, daha yeşil bayrak yaprak oluşumunu destekler.
 Meyve	Çiçeklenme başlangıcı, taç yaprak düşmesi sonrası, mikro besinler ile alımı iyileştirmek için, don ya da doludan sonra	Sürgünlerin büyümesini ve polen çimlenmesini teşvik eder, daha etkili performans ve enerji için kritik fenolojik dönemlerde uygulama yapınız.
 Mısır	Vejetasyonun başlangıcında 15-20 cm yüksekliğe ulaştığında	Daha güçlü yeşil aksam oluşumu, daha sağlam koçan oluşumu sağlar.
 Pamuk	Vejetasyonun başlangıcında, çiçeklenme başlangıcı	Daha güçlü yeşil aksam ve daha sağlam koza oluşumunu destekler.

