

- FAEDCS No. 038808204600001

Patates: Patates Mildiyö (*Phytophthora infestans*) Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Domates(sera): Domates Erken Yaprak Yanıklığı (*Alternaria solani*)

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates(sera): Toprak Kökenli Patojenler (*Fusarium Spp.*, *Pythium Spp.*):

Damla sulama uygulamasında Bitki Koruma Ürünü fideler seraya şaşırtıldıktan sonra fidelerin kök bölgesine verilir. Uygulama öncesi, sade sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslaması sağlanır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı belirlendikten sonra gerekli bitki koruma ürünü miktarı uygulama tankına konur ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılır. Uygulama bittikten sonra da borularda kalan bitki koruma ürününün temizlenmesi için makul bir süre su verilir. Uygulama 15 gün sonra tekrar edilir.

Domates (sera): Kurşuni Kūf (*Botrytis cinerea*): Uygulamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme evresinde iken başlanmalı, 10 gün aralıklarla devam edilerek 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Soğan: Mildiyö (*Peronospora destructor*): Günlük ortalama sıcaklıkların 16 dereceye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir. 14 gün aralıklarla 2 uygulama yapılmalıdır.

Fiado® hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Fiado adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre C5: 29 ve C3: 11 grubu olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Fiado'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (C5: 29 ve C3: 11 grubu harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.

FMC
FIADO®

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	C5: 29	C3: 11	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	--------	--------	----------------------------

375 g/L Fluazinam +150 g/L Azoxystrobin

Deri ile temas: Maddenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla maruziyetten kaçınılmalıdır. Kirliliği sabun ve suyla veya bilinen cilt temizleyici bir madde ile temizleyin. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Göz ile temas: Hemen bol su ile yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın.

Yutulma: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Herhangi bir protez mevcut ise çıkarın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Kusma meydana gelirse, kusmuğun akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır. Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın.

ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ

Belirli bir antidotu yoktur spesifik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



® FMC'nin tescilli markasıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ürünlerin kalite ve garanti eder; fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışı olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklik ve depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Üretici Firma:

CHEMINOVA A/Ş
Thyboronvej 78 DK-7673 Harboore
Danimarka

Üretim Tesisi (Fabrika):

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG Stader
Elbstraße 28, 21683 Stade, Almanya

Ruhsat Sahibi Firma:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/İstanbul
Tel: 0 216 900 24 81
Faks: 0 216 900 24 82
Acil durum tel. (Chemtrec): 0 212 705 53 40

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3380829460
MERSİS No: 0388082946000001

Durmuş Beyazıt

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

08 Eylül 2025