

İmal tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve numarası: 21.04.2015 / 10219

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
TÜTÜN	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	100 ml/da	14 gün
	Tütüntripsi (<i>Thrips tabaci</i>)	100 ml/da	14 gün
	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	75 ml/da	7 gün
HIYAR (Sera)	Yaprak galerisineği (<i>Liriomyza trifolii</i> , <i>L. bryoniae</i> , <i>L. huidobrensis</i>)	75 ml/100 L su	1 gün
KORNIŞON (Sera)	Yaprak galerisineği (<i>Liriomyza trifolii</i> , <i>L. bryoniae</i> , <i>L. huidobrensis</i>)	75 ml/100 L su	
HIYAR-KORNIŞON KABAK (sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/100 L su + 250 ml/100 L su Codacide*	
DOMATES (Sera)	Domates güvesi (<i>Tuta absoluta</i>)	60 ml/100 L su	3 gün
	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	75 ml/100 L su	
	Yaprak galerisineği (<i>Liriomyza trifolii</i> , <i>L. bryoniae</i> , <i>L. huidobrensis</i>)	75 ml/100 L su	
DOMATES-PATLICAN (sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	100 ml/100 L su + 250 ml/100 L su Codacide*	3 gün
DOMATES (Taria)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	75 ml/da	
PATLICAN (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	75 ml/100 L su	
SOĞAN	Tütüntripsi (<i>Thrips tabaci</i>)	100 ml/da+ %0,25 Codacide*	1 gün
SARIMSAK			

FMC Benevia® 100 OD

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Grup	28	Insektisit (Böcek ilacı)
------	----	--------------------------

100 g/L Cyantraniliprole

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan ve gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecelerini solumayınız.
Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bu bitki koruma ürününün uygulandığı sahaya insan ve hayvanların tekrar girişi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. İlaç kuruduktan hemen sonra uygulama yapılan alana girilebilir.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edilen şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının ¼'ün kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:
Deriyle temas halinde, duyarlılık yaratan etkilere yol açabilir.
İLK YARDIM ÖNEMLERİ:
Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.
Yutulması halinde: Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Doktor veya toksisite merkezi tarafından söylenmediği sürece KUSTURMAYINIZ. Kazazede bilinçli ise: Ağzı suyla çalkalayınız.
Gözle teması halinde: Kontakt lens varsa ve çıkartılması kolaysa çıkartınız. Gözleri açık tutarak 15-20 dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.
Deriyle teması durumunda: Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
Soluması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Önemli miktarda maruz kalırsa doktora başvurunuz. Suni solunum ve/veya oksijen gerekli olabilir.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.
Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) telefon numarasını arayarak ilkyardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) Tel: 114



® FMC'nin tescilli markasıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Net Miktar:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Cyantraniliprole, 2-Ethylhexan-1-ol, Calcium Petroleum Sulfonate
ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet kullanınız.
P333 + P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayınız.
P391 Döküntüleri toplayınız.
P501 İçindekileri/konteynerleri yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yetkililere uygun şekilde onaylanmış tesislerde bertaraf ediniz.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- İlacın doğrudan güneş ışığına ve yüksek sıcaklığa maruz kalmasını engelleyiniz.
- Arılar için zehirlidir. Ürünün çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- İpek böceklerine zehirlidir. Bu sebeple ipek böceği üretimi yapılan yerlere ve dut ağaçlarına rüzgarla taşınmasına engel olunuz. Zarardan kaçınmak için çevrede istenen yararlı böceklerin bulunması durumunda dikkatli kullanılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

Daha fazla bilgi için lütfen satıcı firmaya ya da FMC firmasına başvurunuz.

KULLANMADAN ÖNCE İLACIN ŞİŞESİNİ İYİCE ÇALKALAYINIZ.

Dr. Murat KAHYAĞLU
Teknik Müdür
FMC
FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Beşnyva Sok. No:3
Nidakule 2. Kat Kat:15/149
Ataşehir / İST. TÜRKİYE
MERSİS No: 036808294600001

Sayfanın devamı.

MARUL (Taria)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	75 ml/da	1 gün
MARUL (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	75 ml/da	1 gün
PAMUK	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	75 ml/da + 100 ml/da Codacide*	7 gün
	Tütün tripsi (<i>Thrips tabaci</i>)		
	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)		
PAMUK	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	75 ml/da + 250 ml/da Codacide*	7 gün
ÇİLEK (Taria)	Çiçek Tripsleri (<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Frankliniella intonsa</i>)	75 ml/da + 250 ml/da Codacide*	1 gün
PIRASA	Tütüntripsi (<i>Thrips tabaci</i>)	100 ml/da + %0.25 Codacide*	3 gün

*Benevia® 100 OD, Beyazsinek ve trips mücadelesinde kullanılıcaksa Codacide yayıcı yapıştırıcısı ile birlikte kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Benevia® 100 OD önce ayrı bir kapta bit miktarı su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

Benevia® 100 OD ilaçlamadan önce, yaprak üzerinde ilacın kurumasından 2 saat sonra yağın yağmurdan yıkanmaya dayanıklıdır.

ILAÇLAMA ALETİNİN KALİBRASYONU: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Marul (sera) Pamuk yaprak kurdu için tavsiye edilen ilaç normu 30-40l/da'dır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Tütün:

Seftali yaprakbiti (*Myzus persicae*): Tütün tarlalarında yaprakbiti yoğunluğunun aşırı çoğalmasını beklemeden mücadeleye geçilmelidir. Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için bir yaprakta ortalama 25 adet "nimf+ergin" görüldüğünde ilaçlamaya başlanılır. Fide döneminde zararlı görülünce ilaçlama yapılır.

Yeşilkurt (*Helicoverpa armigera*): Kontrol edilen 100 bitkide 20 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanılır.

Tütüntripsi (*Thrips tabaci*): Yaprak başına ortalama 5 tütün tripsi bulunduğu ilaçlama yapılır.

İlaçlamaya başlamadan önce gerekli kalibrasyon yapılmalı ve kullanılacak su miktarı belirlenmelidir. Tütünde kullanılacak su miktarı en az 80L/da en fazla 120L/da olmalıdır.

FMC

Benevia® 100 OD

Yağda Dağılılabilen (OD)

Grup	28	Insektisit (Böcek İlacı)
------	----	--------------------------

100 g/L Cyantraniliprole

FİRMA BEYANI :

FMC bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zarar, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ilaçta tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

Ruhsat Sahibi:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/İstanbul
Tel: 0 216 900 24 81
Faks: 0 216 900 24 82
Acil durum tel. (Chemtec) : 0 212 705 53 40

Üretici Firma:

FMC Corporation
2929 Walnut Street, Philadelphia
Pennsylvania 19104 ABD

Üretim Tesisi:

Cheminova Deutschland GmbH & Co KG
Stader Elbstrasse 26, 21683 Stade, Almanya



30 Eylül 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

FMC'nin tescilli markasıdır.

Dr. Murat KAHYAĞOĞLU
FMC
FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir/İST. T.C. M.K.P. V.D. 3880829460
MERCİS No: 388082946000001

Domates:

Domates qüvesi (*Tuta absoluta*): Üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilir. 100 bitkiden 3'ü yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.

Yeşilkurt (*Helicoverpa armigera*): Yeşilkurt mücadelesinde esas, koruyucu mücadele yapmaktır. Larvalar meyveye giriş yapmadan önce ilaçlamayı başlatmak gerekir. Tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta veya larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunursa derhal mücadeleye geçilir. **Benevia® 100 OD** ile en iyi etki için yumurtaların bıraktığı veya yeni açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. İlaçlamadan 10 gün sonra tarlalar kontrol edilir. İlaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa ilaçlama tekrarlanır.

Soğan ve Sarımsak:

Tütüntripsi (*Thrips tabaci*): Soğan yetiştiriciliğinde, bitki gelişiminin orta dönemlerinde bitki başına ortalama 30 trips bulunduğu mücadele başlanır. Soğanda ve sarımsakta kullanılacak su miktarı ortalama 50-60L/da olmalıdır. Bir sezonda aynı tütün, soğan ve sarımsak tarlasında 2'den fazla **Benevia® 100 OD** uygulaması yapılmaz.

Domates, Patlıcan ve Marul:

Pamuk Yaprak Kurdu (*Spodoptera littoralis*): Yapılan kontrollerde 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Survey 10-12 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı popülasyonu görülmesi halinde ilaçlamalar tekrarlanmalıdır.

Domates, Hıyar ve Kornişon:

Yaprak galeri sineği (*Liriomyza trifolii*, *Liriomyza bryoniae*, *Liriomyza huidobrensis*): Serada yaprak galeri sinekleri erginlerinin çıkışını belirlemek amacıyla dekara 1 adet olmak üzere sarı yapışkan tuzak bitkinin 10-15 cm yukarsına asılır. Erginler tuzakta görüldüğü zaman örnekleme yapılır. Bir dekarlık alanda en az 30 bitki seçilir. Bu bitkilerin alt, orta ve üst yaprakları toplanarak sayım yapılır. Sayımda küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 4, büyük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 larva tespit edilirse ilaçlamaya karar verilir. İlaçlamaya başlamadan önce gerekli kalibrasyon yapılmalı ve kullanılacak su miktarı belirlenmelidir. Hıyarda serada kullanılacak su miktarı en az 50L/da en fazla 120L/da olmalıdır.

Domates, Patlıcan, Hıyar, Kornişon ve Kabakda:

Tütün beyazsineği (*Bemisia tabaci*): Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlalar köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır. Popülasyonun devam etmesi durumunda 10 gün arayla ikinci uygulama yapılabilir.

Pamuk:

Tütün beyazsineği (*Bemisia tabaci*): Beazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğu mücadele başlanmalıdır.

Tütün tripsi (*Thrips tabaci*): Pamuk fidesi 1-3 gerçek yapraklı dönemde iken zararlı popülasyonu, yaprak başına 1 adet (nimf veya ergin) düzeyine geldiğinde mücadele yapmak gerekir.

Pamuk Yaprakbitti (*Aphis gossypii*): Erken gelişim döneminde yaprakbitti için % 50 bulaşma görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Yaprakbitti için ileri dönemlerde haftada bir yapılan surveylerde yaprak başına 25 adet ergin + nimf sayısına ulaşıldığında uygulama yapılmalıdır.

Yeşilkurt (*Helicoverpa armigera*): Rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larva sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğu uygulamaya karar verilir.

Çilek:

Çiçek Tripleri (*Frankliniella occidentalis*, *Frankliniella intonsa*): Yapılan kontroller sonrasında popülasyon yoğunluğu ortalama 10 trips/çiçek olduğunda kimyasal mücadeleye karar verilmelidir.

Pırasa:

Tütüntripsi (*Thrips tabaci*):

Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

Benevia® 100 OD hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

FMC

Benevia® 100 OD

Yağda Dağılılabilen (OD)

Grup	28	Insektisit (Böcek İlacı)
------	----	--------------------------

100 g/L Cyantraniliprole



30 Eylül 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Dr. Murat KAHYACIOĞLU
Teknik Müdür
FMC
FMC TURKEY ENERJİ VE ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Bulvarı, Başkaya Sok. No:3
Nidake Sok. Kat:15/149
Ataşehir / İST. / TÜRKİYE
MERSİS No: 036808294600001

Yayıcı yapıştırıcının kullanılması: uygun, güvenli yayıcı yapıştırıcılar Benevia® 100 OD'ye eklendiği zaman zararlı kontrolünü artırır. Sadece, tarımsal kullanım için etiketlenmiş yayıcı yapıştırıcıları kullanınız ve üreticinin etiketinde yer alan talimatları takip ediniz. Uyumluluk için ön karışım testi yapınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Benevia® 100 OD adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 28 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Benevia® 100 OD'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 28 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Bir sezonda aynı serada 4'den fazla, açık alanda ise 2'den fazla Benevia® 100 OD uygulaması yapmayınız. Bu etiketteki "direnç ile ilgili bilgi" kısmında yer alan diğer kurallara da uyunuz.

Benevia® 100 OD hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz."

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Formülasyonlarda değişiklikler olabileceği için kullanıcıların, geniş çapta uygulama yapmadan önce istenen karışımı küçük miktarlarda test ederek çökeltme ve katılaşma olup olmadığını gözlemlenmeleri önerilir. Farklı özelliklerde değişik materyallerin karışımları ve yoğun karışımlar tavsiye edilmez. Karışım yapılacaksa, Benevia® 100 OD' nin ve diğer karışım yapılacak pestisitlerin etiketinde yer alan sınırlamalara ve önlemlere uyunuz. Etiketinde yer alan kullanım dozunu aşmayın. Etiketinde bu tür karışımlarla ilgili sınırlamaları olan ilaçlarla karışım yapmayınız.

Kısıtlamalar: Sebze fideliklerinde uygulama yapmayınız. Stres altındaki bitkilere uygulama yapmayınız.

□ FMC'nin tescilli markasıdır.



30 Eylül 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Dr. Murat KAHYAĞAÇLI
Teknik Sorumlusu
FMC TURKEY FİDAN ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Beğonya Sok. No:3
Nidakule A Blok Kat: 15/149
Atayehir / İST. TÜRKİYE
MERSİS No: 036808194600001