



An Agricultural
Sciences Company



Fiado® Fungisit

SÖZ KONUSU HASTALIKSA ÇÖZÜM FİADO®

ag.fmc.com/tr

[f/fmcturkey](https://www.facebook.com/fmcturkey)

[ig/fmcturkey](https://www.instagram.com/fmcturkey)

[y FMC Turkey](https://www.youtube.com/channel/UCFMC_Turkey)

[in FMC Turkey](https://www.linkedin.com/company/fmc-turkey)

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Bitki koruma ürünlerini uygularken daima ürün etiketini takip ediniz.





An Agricultural
Sciences Company

Fiado®

Fungisit

Aktif maddesi: 375g/l Fluazinam + 150g g/l Azoxystrobin

Formülasyonu: Süspansiyon Konsantre (SC)

Fiado® domateste birçok fungal hastalıkla mücadelede kullanılan koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip kontak, sistemik ve translaminar bir fungusittir. Hastalık etmeninin bitkilere ilk girişinden sonra domateste 1-2 gün içinde yapılacak ilaçlama ile hastalığın gelişimi durdurulabileceği için erken dönemde uygulamalara başlanmalıdır.

Özellikleri:



• Güçlü koruyucu ve tedavi edici özellik gösterir



• Uzun süreli etkili koruma sağlar



• Hastalığın her evresinde etkilidir



• Hastalık sporlarını etkisiz hale getirerek diğer bitkilere bulaşmaları engeller



• Yağmurdan yıkanmaya karşı son derece dirençlidir.



Domateste Mildiyö Zararı
(*Phytophthora infestans*)



Kurşuni Küf
(*Botrytis cinerea*)



Erken Yaprak Yanıklığı
(*Alternaria solani*)



Toprak Kökenli Fungal Patojenler
(*Fusarium Spp.*
Phytophthora Spp.)

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanım Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	50 ml/da	3 gün
Domates (sera)	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	50 ml/100 l su	3 gün
	Toprak Kökenli Fungal Patojenler (<i>Fusarium Spp.</i> , <i>Phytophthora Spp.</i>)	200ml/da	3 gün
	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	50ml/da	7 gün
Soğan	Mildiyö (<i>Peronospora destructor</i>)	50ml/da	7 gün