

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.: 23.12.2024/13363

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Domates (sera)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	75 ml/100 L su	7
Domates (Tarla)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	50 ml/da	7
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	50 ml/da	14

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan METIKOLOS® önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Patates ve Domates (Tarla) Mildiyö hastalığı mücadelesi için dekara uygulanacak su miktarı 50 litre olarak tavsiye edilir.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates (sera) Domates (Tarla) Domates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde, sıcaklığın 16°C ve nisbi nemin %80 olduğu koşullarda ilaçlamaya başlanır. Şayet hastalık her yıl görülüyor ise ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Koşullara, hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 10-12 günlük aralıklarla tekrarlanır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

20 Mayıs 2023

FMC METIKOLOS® SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	C5:29	U:27	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-------	------	-------------------------

(300 g/L Fluazinam + 200 g/L Cymoxanil)

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin). Zehirlenme belirtileri birkaç saat sonra bile ortaya çıkabilir; bu nedenle kazadan sonra en az 48 saat tıbbi gözetim gereklidir.

İLK YARDIM ÖNEMLERİ: Hastayı sıcak tutarak doktora gidiniz. İlaç ve etiketini birlikte götürünüz.

Solumum: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun. Bilinç kaybı durumunda hastayı nakil için sabit yan pozisyona getirin.

Deri ile temas: Anında su ve sabunla yıkayın ve iyice durulayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun. Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları yeniden kullanmadan veya atmadan önce temizleyin.

Göz ile temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Kirlenmiş su ile etkilenmemiş gözü durulamamaya dikkat edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.



® FMC'nin tescilli markasıdır.

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Fluazinam, Cymoxanil içerir.

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H361fd Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocuksa hasara yol açma şüphesi var.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organ hasara yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.

P263 Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yağmurluk kullanınız.

P391 Döküntüleri toplayınız.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

SP1 Ürün veya kabı ile suyu kirletmeyin.

P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf ediniz.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı sularına ve su kaynaklarına bulandırmayınız.
- Ürün atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme sularına bulandırmayınız.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emic maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha ediniz.
- Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişim olmaz.

FMC

FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule-Ataşehir/Kuzey Kat:15/149
İstanbul / TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 272200
MERSİS No: 08294600000000000000

Patates Mildiyö: Hastalığın her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında, hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16 °C veya en düşük sıcaklığın 10 °C'yi bulması ile ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise ilaçlamaya başlamak için çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtilerinin görülmesi beklenmelidir. İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanmalı ve hava koşullarının devam etmesi durumunda 7 – 10 gün arayla uygulamaya devam edilmelidir.

Patateste mildiyöye karşı METIKOLOS® ile sezonda en fazla 2 uygulama yapılmalıdır

Metikolos® hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

METIKOLOS® adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grubu C5;29 ve U:27 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için METIKOLOS®'u aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C5;29 ve U:27 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.

FMC METIKOLOS® SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	C5:29	U:27	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-------	------	-------------------------

(300 g/L Fluazinam + 200 g/L Cymoxanil)

Yutma: Hemen doktora başvurun. KUSTURMAYIN. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Kusma kendiliğinden olabilir. Yutulan ürünün aspirasyonunu önlemek için kişiyi yan yatırın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Hastada gözlenen belirtiler değerlendirilerek uygun tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARUL EDİLMEZ

20 Mayıs 2020



® FMC'nin tescilli markasıdır.

FİRMA BEYANI:

FMC bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. İlacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları karşılamak mümkün değildir. Mahsül zararı, tesirsizlik ve istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi madde bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama kuralları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. Riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLAÇI YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

Üretici Firma:

SIPCAM OXON SpA- Via Sempione,
195, 20016 Pero (MI) - İtalya

Üretim Yeri: SIPCAM OXON SpA – Via Vittorio Veneto
26857 Salerano sul Lambro (LO) - İtalya

Ruhsat Sahibi

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/İstanbul
Tel: 0 216 900 24 81
Faks: 0 216 900 24 82
Acil durum tel. (Chemtrec): 0 212 705 53 40

FMC

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
MERSİS No: 038808294600001

Durmuş DEMİRE
Genel Müdür