



CIRCADEN® 200 SC
İnsektisit

Mükemmel Zararlı Kontrolü

BENEVIA® 100 OD
İnsektisit

	 CIRCADEN® 200 SC 	 BENEVIA® 100 OD 
Aktif Madde	200 g/L Cyantraniliprole	100 g/L Cyantraniliprole
Formülasyon	SC (Süspansiyon Konsantre)	OD (Yağda Dağılılabilen)
Uygulama Türü	Damla sulama	Yeşil aksam
Etki Mekanizması	Zararlıların kas fonksiyonlarının bozulması sonucu; hızlı bir şekilde beslenme durur, hareketlilik azalır ve zararlıda ölüm meydana gelir	

****Uyarı: Benevia® 100 OD'nin mutlaka Codacide® ile karıştırılıp uygulanması tavsiye edilmektedir!**

ZARARLILARLA MÜCADELEDE, SÜPER İKİLİ



Domates Güvesi
(*Tuta absoluta*)



Beyazsinek
(*Bemisia tabaci*)



Çiçek Tripsleri
(*Frankliniella occidentalis*,
Frankliniella intonsa)



Pamuk Yaprakkurdu
Prodenya
(*Spodoptera littoralis*)



Yaprak Galerisineği
(*Liriomyza trifolii*,
Liriomyza bryoniae,
Liriomyza huidobrensis)



Yeşilkurt
(*Helicoverpa armigera*)

VİRÜS TAŞINMASINDA AZALMA

Benevia® 100 OD ve **Circaden® 200 SC**, zararlıların erken dönemlerinde uygulandığında, trips, yaprak biti ve beyaz sinek gibi emici böceklerle taşınan virüs hastalıklarının azaltılmasında yardımcı olur. Virüslere karşı koruma, sağlıklı ürünlere sahip olmak demektir. Aynı zamanda verim ve kalitenin artması anlamına gelir.

Ürün	Patojen	Vektör
Domates	Domates Sarı Yaprak Kıvrık Virüsü (TYLCV)	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)
Domates, Biber	Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV)	Çiçek tripsleri (<i>Frankliniella spp.</i>)
Hıyar	Hıyar Mozaik Virüsü (CMV)	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)

BENEVIA® 100 OD VE CIRCADEN® 200 SC'NİN BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ



Arılara Bekleme Süresi "0" Gün!



Yararlı Böceklerle Karşı Son Derece Güvenli!



Farklı Türden Zararlılara Karşı Etkili!



Damla Sulamada Uygulama Kolaylığı!



**MUTLU SON İÇİN
BAŞLANGIÇTA DOĞRU SEÇİM**



CIRCADEN® 200 SC'NİN RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Uygulama Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Hıyar Kornişon	Yaprak galerisineği (<i>Liriomyza trifolii</i> , <i>L. bryoniae</i> , <i>L. huidobrensis</i>)	50 ml/da (damla sulama ile)	1 gün
Biber (Tarla-Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	35 ml/da (damla sulama ile)	3 gün
Biber (Sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	50 ml/da (damla sulama ile)	3 gün
Domates (Sera)	Domates güvesi (<i>Tuta absoluta</i>)	35 ml/da (damla sulama ile)	3 gün
	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	50 ml/da (damla sulama ile)	3 gün
	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	35 ml/da (damla sulama ile)	3 gün
Domates (Tarla-Sera)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	50 ml/da (damla sulama ile)	3 gün
Patlıcan (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	40 ml/da (damla sulama ile)	1 gün
Marul (Tarla)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)		

BENEVIA® 100 OD'NİN RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Uygulama Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Tütün	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	100 ml/da	14 gün
	Tütüntripsi (<i>Thrips tabaci</i>)	100 ml/da	14 gün
	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	75 ml/da	7 gün
Hıyar (Sera)	Yaprak galerisineği (<i>Liriomyza trifolii</i> , <i>L. bryoniae</i> , <i>L. huidobrensis</i>)	75 ml/100 L su	1 gün
Kornişon (Sera)	Yaprak galerisineği (<i>Liriomyza trifolii</i> , <i>L. bryoniae</i> , <i>L. huidobrensis</i>)	100 ml/100 L su + 250 ml/100 L su Codacide®	3 gün
Hıyar Kornişon Kabak (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	60 ml/100 L su	3 gün
Domates (Sera)	Domates güvesi (<i>Tuta absoluta</i>)	75ml/100 L su	3 gün
	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	100 ml/100 L su + 250 ml/100 L su Codacide®	3 gün
	Yaprak galerisineği (<i>Liriomyza trifolii</i> , <i>L. bryoniae</i> , <i>L. huidobrensis</i>)	75 ml/da	3 gün
Domates Patlıcan (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	75 ml/da	3 gün
Domates (Tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	100 ml/da + %0,25 Codacide®	1 gün
Patlıcan (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	75 ml/da	1 gün
Soğan	Tütüntripsi (<i>Thrips tabaci</i>)	75 ml/da + 250ml/da Codacide®	7 gün
Sarımsak			
Marul (Tarla)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	75 ml/da	1 gün
Marul (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	75 ml/da	1 gün
Pamuk	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	75 ml/da + 250ml/da Codacide®	7 gün
	Tütün tripsi (<i>Thrips tabaci</i>)		
	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)		
Pamuk	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	75 ml/da + 250ml/da Codacide®	7 gün
Çilek (Tarla)	Çilek Tripsleri (<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Frankliniella intonsa</i>)	75 ml/da + 250ml/da Codacide®	1 gün
Pırasa	Tütüntripsi (<i>Thrips tabaci</i>)	100 ml/da + %0.25 Codacide®	3 gün

Benevia® 100 OD beyazsinek mücadelesinde kullanılacaksa mutlaka **Codacide®** yayıcı yapıştırıcısı ile birlikte kullanılmalıdır. Böceklerde direnç oluşmaması için bir sezonda aynı serada 4, aynı tarlada 2'den fazla **Benevia® 100 OD** ve **Circaden® 200 SC** uygulaması yapmayınız.

