



An Agricultural
Sciences Company



CORAGEN® 20 SC

İnsektisit

**SALKIM GÜVESİNE KARŞI
YÜKSEK ETKİ, UZUN SÜRELİ
KORUMA**

ag.fmc.com/tr



/fmc-turkey



/fmc-turkey



FMC Turkey



FMC Turkey

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Bitki koruma ürünlerini uygularken daima ürün etiketini takip ediniz.





An Agricultural
Sciences Company

Coragen® 20 SC

İnsektisit

Aktif maddesi: 200 g/l Chlorantraniliprole
Formülasyonu: Suspansiyon Konsantre (SC)

Coragen® 20 SC bağda önemli zararlıların başında gelen Salkım güvesi (*Lobesia botrana*)'ya karşı zararlının yumurta döneminde kullanılabilen, diğer birçok insektisitten farklı etki mekanizması ile IRAC 28 grubunda yer alan, üstün özellikleri olan bir insektisittir.

Özellikleri:

- Coragen® 20 SC yüksek biyolojik aktiviteye sahiptir.
- Düşük dozlarda etkin koruma sağlar.
- Yaprak içinde taşınır (translaminar etki).
- Zararlıyı tek başına kontrol edebilme özelliğinin yanında, diğer insektisitlerle ve fungusitlerle de mükemmel karışılabilirlik gösterir.
- Üstün formülasyonu sayesinde ilacın uygulamaya hazırlanması ve ilaçlama aletinin temizlenmesi çok kolaydır.

Beslenmeyi

durdurma etkisi : **Coragen® 20 SC** ilaçlamadan çok kısa bir süre sonra larvaların beslenmesini hızla durdurur. Bitkiye zarar vermeden zararlıyı hızlı bir şekilde kontrol altına alır. Bir süre sonra larvalarda ölüm gerçekleşir.



Yumurta Etkisi
(Yumurta açılmadan ölmüş larva)



Yumurta - Larva Etkisi
(Larva, membrandan ısırtığı aldıktan sonra yumurta içinde ölüyor)



Yumurta - Larva Etkisi
(Larva, yumurtadan çıkmadan ölüyor)

Sorunsuz ihracat:

Coragen® 20 SC'nin Avrupa Birliği harmonize edilmiş MRL (Maksimum Kalıntı Limitleri) değerleri sofralık ve şaraplık üzümde ve asma yaprağında belirlenmiş durumdadır. Asma yaprağı toplanacak bağlarda güvenle kullanılabilir.



Salkım Güvesi Zararı
(*Lobesia botrana*)



Salkım Güvesi Larvası
(*Lobesia botrana*)



Salkım Güvesi Yumurtası

Kısa bekleme süresi:

Uygulama Zamanı:

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre sofralık üzümde 3 gün, asma yaprağı için 7, şaraplık üzümde 28 gündür.

Bağda Salkım Güvesi (*Lobesia botrana*) mücadelesinde en iyi etki için zararlının yumurta döneminde, yumurtalar açılmadan ve larvalar meyveye giriş yapmadan uygulanmalıdır. İlaçlama zamanının tespiti için bağın fenolojisi ve zararlının biyolojisi (kelebek uçuşları) takip edilmeli, yayımcı kuruluşlardan da bilgi alınmalıdır. Zararlının yoğunluğuna ve dönem içinde ergin uçuşlarına bağlı olarak ilaçlama 10-14 gün arayla tekrarlanmalıdır.

Bağda sezon içinde sofralık üzümlerde 2, şaraplık üzümlerde 1'den fazla uygulama yapmayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanım Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arası Süre
Bağ	Salkım güvesi	15 ml/100lt (yumurta)	3 gün (sofralık üzüm) 28 gün (şaraplık) 7 gün (asma yaprağı)

