



An Agricultural
Sciences Company

CORAGEN® 20 SC

İnsektisit

**YÜKSEK ETKİ
MÜKEMMEL KORUMA**



ag.fmc.com/tr

[f/fmcturkey](https://www.facebook.com/fmcturkey)

[ig/fmcturkey](https://www.instagram.com/fmcturkey)

[FMC Turkey](https://www.youtube.com/channel/UCFMC_Turkey)

[in FMC Turkey](https://www.linkedin.com/company/fmc-turkey)

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Bitki koruma ürünlerini uygularken daima ürün etiketini takip ediniz.





Coragen® 20 SC

Insektisit

Aktif maddesi: 200 g/l Chlorantraniliprole
Formülasyonu: Suspansiyon Konsantre (SC)

Coragen® 20 SC elma ve armutta önemli zararlıların başında gelen Elma İçkurdu (*Cydia pomonella*) ve Yaprak Galerisi Güvesi (*Leucoptera scitella*)'ya karşı zararlıların yumurta döneminde kullanılabilen, diğer birçok insektisitten farklı etki mekanizması ile IRAC 28 grubunda yer alan, üstün özellikleri olan bir insektisittir.


Özellikleri:

- **Coragen® 20 SC** yüksek biyolojik aktiviteye sahiptir
- Düşük dozlarda etkin koruma sağlar
- Yaprak içinde taşınır (translaminar etki)
- Zararlıyı tek başına kontrol edebilme özelliğinin yanında, diğer insektisitlerle ve fungusitlerle de mükemmel karışabilirlik gösterir
- Üstün formülasyonu sayesinde ilacın uygulamaya hazırlanması ve ilaçlama aletinin temizlenmesi çok kolaydır

Beslenmeyi

durdurma etkisi : **Coragen® 20 SC** ilaçlamadan çok kısa bir süre sonra larvaların beslenmesini hızla durdurur. Bitkiye zarar vermeden zararlıyı hızlı bir şekilde kontrol altına alır. Bir süre sonra larvalarda ölüm gerçekleşir.

Coragen® 20 SC Yumurta - Larva ve Larva Etkileri



Sorunsuz ihracat:

Harmonize edilmiş MRL (Maksimum Kalıntı Limitleri) değerleri Coragen® 20 SC kullanılmış ürünlerin ülkeler arasında ticaretini kolaylaştırır.



Armut Yaprak Galerigüvesi
(*Leucoptera scitella*)



Elma İçkurdu
(*Cydia pomonella*)

Uygulama Zamanı:

Elma içkurduna karşı ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Coragen® 20 SC ile bu zararlı ile mücadelede en iyi etki her dölle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armutta tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.

İlacın etki süresi dikkate alınarak 14 gün sonra 1. dölle karşı ilaçlama tekrarlanmalıdır. İkinci ve daha sonraki döllere karşı da zararlı ilaçlamayı gerektirecek yoğunlukta olduğu takdirde aynı şekilde ilaçlamalara devam edilmelidir. Bu ilaçlamalar direnç ile ilgili bölümde belirtilen kurallara bağlı kalınarak farklı etki mekanizmasına sahip ilaçlar ile yapılmalıdır.

Elma ve armutta sezon içinde 2'den fazla Coragen® 20 SC uygulaması yapmayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanım Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arası Süre
Elma / Armut	Armut Yaprak Galerigüvesi (<i>Leucoptera scitella</i>)	17,5 ml / 100 lt su	14 gün
	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	12,5 ml / 100 lt su (yumurta)	

