



An Agricultural
Sciences Company



CORAGEN® 20 SC

İnsektisit

**MISIR KOÇAN VE SAP KURDUNA
KARŞI DAMLA SULAMA İLE
UYGULAMA KOLAYLIĞI ETKİLİ
VE UZUN SÜRELİ KORUMA**



ag.fmc.com/tr

[f/fmcturkey](https://www.facebook.com/fmcturkey)

[ig/fmcturkey](https://www.instagram.com/fmcturkey)

[FMC Turkey](https://www.youtube.com/channel/UCFMC_Turkey)

[in FMC Turkey](https://www.linkedin.com/company/fmc-turkey)

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Bitki koruma ürünlerini uygularken daima ürün etiketini takip ediniz.



An Agricultural
Sciences Company

Coragen® 20 SC

İnsektisit

Aktif maddesi: 200 g/l Chlorantraniliprole
Formülasyonu: Suspansiyon Konsantre (SC)

Coragen® 20 SC mısırdaki sorun olan Mısır koçankurdu (*Sesamia nonagrioides*), Mısırkurdu (*Ostrinia nubilalis*) ve Bozkurt (*Agrotis ipsilon*, *Agrotis segetum*) zararlılarına karşı kullanılan, yeni bir etki mekanizmasına sahip, üstün özellikli bir insektisittir.

Özellikleri:

- **Coragen® 20 SC** yüksek biyolojik aktiviteye sahiptir
- Düşük dozlarda etkin koruma sağlar
- Yaprak içinde taşınır (translaminar etki)
- Zararlıyı tek başına kontrol edebilme özelliğinin yanında, diğer insektisitlerle ve fungusitlerle de mükemmel karışabilirlik gösterir
- Üstün formülasyonu sayesinde ilacın uygulamaya hazırlanması ve ilaçlama aletinin temizlenmesi çok kolaydır

Beslenmeyi

durdurma etkisi : **Coragen® 20 SC** ilaçlamadan çok kısa bir süre sonra larvaların beslenmesini hızla durdurur. Bitkiye zarar vermeden zararlıyı hızlı bir şekilde kontrol altına alır. Bir süre sonra larvalarda ölüm gerçekleşir.

Damla sulama ile uygulama:

Mısır koçankurdu ve mısırkurdu zararlılarının ilk yumurtalarının görülmesinden itibaren damla sulama yöntemiyle 15 gün ara ile 2 ilaçlama yapılır.



Mısır Koçankurdu
(*Sesamia nonagrioides*)



Mısırkurdu
(*Ostrinia nubilalis*)



Bozkurt
(*Agrotis ipsilon*,
Agrotis segetum)



**Sap ve Koçankurdu
Zararı**

Uygulama Zamanı:

Mısır koçankurdu ve Mısırkurdu zararlıları ile mücadelede ilk yumurtaların görülmesinden itibaren 15 gün aralarla 2 ilaçlama yapılır. Ek ilaçlamaların gerekli olduğu durumlarda farklı etki mekanizmasına sahip ilaçlar kullanılmalıdır.

Bozkurt (*Agrotis ipsilon*, *Agrotis segetum*) zararlısı ile mücadelede zararlının bulunması muhtemel olan ya da sıraya ekim yapılan yerlerde, 10 ayrı yerde 3'er metrelik sıralar üzerinde en az 2 yenik bitkinin bulunduğu tarlalarda ilaçlama yapılmalıdır.

Mısırdaki sezon içinde aynı yerde 2'den fazla Coragen® 20 SC uygulaması yapmayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanım Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arası Süre
 Mısır	Mısır koçankurdu (<i>Sesamia spp.</i>)	15 ml / da (15 gün ara ile 2-3 uygulama)	14 gün
	Mısırkurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)		
	Bozkurt (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>)	15 ml / da	
	Güz tırtılı (<i>Spodoptera frugiperda</i>)		
Mısır (Damla sulama ile)	Mısır koçankurdu (<i>Sesamia spp.</i>)	35 ml / da (15 gün ara ile 2 uygulama)	21 gün
	Mısırkurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)		

