FMC
An Agricultural Sciences Company





EGNIT®

Desikant (Yaprak Kurutucu)

PAMUK HASADINDA FMC YANINIZDA

ag.fmc.com/tr /fmcturkey /fmcturkey FMC Turkey FMC Turkey

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Bitki koruma ürünlerini uygularken daima ürün etiketini takip ediniz.



FMC An Agricultural Sciences Company

EGNIT®

Desikant (Yaprak Kurutucu)

Aktif maddesi: 60 g/l Carfentrazone-ethyl
Formülasyonu: Mikro-Emülsiyon(ME)
Etki şekli: Kontak

Egnit®, Carfentrazone-ethyl protoporfirin oksidaz (PPO) enzimini engelleme yoluyla çalışır. Fotosentez sekteye uğrar. Oksidaz madde üretimi artar. Hücre zarının tahrip olması sonucu uygulanan kısımlarda hızlı nekrozlar görülmeye başlar. Bu şekilde yaprak dökümü süreci hızlanır.

Özellikleri:

- **Egnit®** ürün hızlı bir şekilde yapraklar tarafından emilir.
- **Egnit®** uygulamasından sonra 1-2 saat yağış olmaması yeterlidir.
- **Egnit®**'in performansı farklı sıcaklık koşullarından etkilenmez. Özellikle serin koşullarda hormonal terkipli rakiplerine göre performansı daha tutarlı ve iyidir.
- **Egnit®** bitki dokularında taşınmaz.
- **Egnit®** problem olan Köpek üzümü (Solanum nigrum), Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) ve Sirken (Chenopodium album) gibi yabancı otlara da etki göstererek hasatı daha kolay hale getirir.
- **Egnit®** kokulu değildir.

Çevresel Etkiler:

- Uygulama zamanındaki güneş ışığı, sıcaklık ve bağıl nem gibi hava koşulları birçok hasat yardımcısı ürünün performansını etkileyen önemli kriterlerdir.
- Uygulamadan sonraki 3-5 günlük hava koşulları da kritik olabilir.
- Uygulamadan sonraki gece sıcaklıkları yine aynı şekilde önemlidir.

Genel Uygulama Önerileri :

- **Egnit®** uygulaması için öncelikle kozaların %70-80'i açılmış olmalıdır.
- Hasattan 10-14 gün önce uygulanmalıdır.
- Dekara minimum 20-40 lt arasında su ile uygulanmalıdır.
- Maksimum sprey basıncı 3 atmosfer olmalıdır.
- İyi bir etki için iyi bir kaplama yapmak gereklidir.
- İdeal uygulama koşulları genellikle Eylül ve Ekim ayı içerisinde öğleden sonra güneşli olan dönemlerdir.
- Genellikle uygulamadan 15-21 gün önce sulama kesilmiş olmalıdır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Uygulama Amacı	Uygulama Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Pamuk hasadından 10-14 gün önce	50 ml/da	14 gün