

Гербіцид для  
перфекціоністів



## Еллай® Супер

Гербіцид

Якісний контроль широкого спектру дводольних бур'янів у посівах зернових колосових культур, особливо в осінній період

**Діючі речовини:**

Трибенурон-метил – 500 г/кг

Метсульфурон-метил – 200 г/кг

**Норма використання:**

15 г/га + ПАР Тренд® 90 0,25-0,3 л/га

**Препаративна форма:**

Водорозчинні гранули (в.г.)

**Реєстрація:**

Озима та яра пшениця

Ячмінь ярий та озимий

**Упаковка: Пластмасова банка**


150 г - на 10 га

- **Діючі речовини** гербіциду **Еллай® Супер** належить до групи АЛС інгібіторів
- Проникаючи в бур'ян, **Еллай® Супер** блокує фермент ацетолактатсинтазу (АЛС), внаслідок чого зупиняється синтез ферментів лейцин, ізолейцин та валін
- Видимі симптоми з'являються через 5-8 днів після внесення гербіциду, а повна загибель бур'янів настає через 12-21 дні

Селективний до пшениці та ячменю від стадії 2-3  
листіків до початку виходу в трубку

**Еллай® Супер**

Ефективний від +5° С середньодобової  
температури



# ЧУТЛИВІСТЬ БУР'ЯНІВ ДО ЕЛЛАЙ® СУПЕР


| Чутливість бур'янів                              | Еллай® Супер |
|--|--------------|
| Підмаренник чіпкий                               | ++           |
| Лобода біла (2-4 листки)                         | ++++         |
| Амброзія, види, окрім АЛС резистентних популяцій | ++           |
| Падалиця звичайного соняшнику                    | ++++         |
| Падалиця CL, Express соняшнику                   | +++          |
| Падалиця звичайного ріпаку                       | ++++         |
| Падалиця CL ріпаку                               | +++          |
| Гірчак, види                                     | +++          |
| Фіалка польова                                   | ++           |
| Волошка синя                                     | ++           |
| Сокирки польові                                  | +++          |
| Мак дикий  | ++++         |
| Осот жовтий (з насіння)                          | ++++         |
| Осот рожевий (з насіння)                         | ++++         |
| Редька дика                                      | ++++         |
| Талабан польовий                                 | ++++         |
| Капуста польова                                  | ++++         |
| Кучерявець Софії                                 | ++++         |
| Грицики звичайні                                 | ++++         |
| Рутка лікарська                                  | ++           |

|      |        |
|------|--------|
| ++++ | >90%   |
| +++  | 70-90% |
| ++   | 40-70% |
| +    | <40%   |

# Переваги використання

- **Забезпечує відсутність конкуренції з боку бур'янів восени та з самого початку весняної вегетації, дозволяє значно зменшити гербіцидне навантаження навесні**
- **Економічне рішення для зменшення рівня забур'яненості зернових в осінній період, низька норма внесення на гектар**
- **За рахунок поєднання двох діючих речовин (метсульфурон-метил та трибенурон-метил), навіть у невеликих нормах, відмінно контролює** падалицю ріпаку та соняшнику, основні зимуючі види бур'янів та багаторічні бур'яни, серед них, хрестоцвіті (редька дика, талабан польовий, кучерявець Софії, гірчиця польова, грицики звичайні, капуста польова), види осотів(з насіння), лобода біла (2-4 листки).  
Середньочутливі- мак дикий, фіалка польова, сокирки польові.
- **Наявність добре вираженої ґрунтової дії.**
- **Еллай® Супер застосовується в осінній період** (від фази 3-х листків культури), добре сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив та не має обмежень для наступних культур сівозміни
- **Гнучкий щодо температурного режиму та є ефективним від +5 °C (середньодобова)**

# ФМС ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ



Шукайте детальну інформацію на нашому сайті

[www.fmc.com.ua](http://www.fmc.com.ua)

та завантажуйте електронний каталог FMC



**Повне портфоліо компанії  
завжди під рукою**

*Завантажуйте та будьте  
постійно на зв'язку з нами!*

