

До високих врожаїв
без зупинки
на бур'яни

Експрес®

Гербіцид

Інноваційна технологія післясходового захисту гібридів соняшника з властивістю Express від широкого спектру дводольних бур'янів

Післясходовий контроль усіх наявних дводольних бур'янів у посівах соняшника

18% від загальної площі посіву 1,1 млн.га - площі посівів соняшника з технологією Експрес в Україні

Без післядії на наступну культуру у сівозміні



Висока економічна рентабельність у порівнянні іншими технологіями



Опис препарату

Діючі речовини:

Трибенурон-метил 750 г/кг

Норма використання:

30-50 г/га

Препаративна форма:

Водорозчинні гранули (в.г.)

Реєстрація:

Соняшник (з властивістю Express)

Упаковка:

Пластмасова банка 500г

Термін зберігання:

3 роки



Експрес™ 75 ВГ – це розширений контроль найбільш проблемних бур'янів!

Культура	Препарат	Норма витрати	Фаза застосування
Соняшник (з властивістю Експрес)	Експрес® 75 ВГ	40-50 г/га + ПАР Тренд® 90 0,25-0,3 л/га	2-8 листків у культури. Ранні фази розвитку бур'янів
	Експрес™ 75 ВГ(дробне застосування)	30+20 г/га + ПАР Тренд® 90 0,25-0,3 л/га , не більше 50 г/га за сезон	



- Амброзія (2 листки) , окрім АЛС резистентних популяцій
- Гірчак, види
- Біфора промениста
- Вероніка, види
- Волошка синя
- Галінсога
- Гірчиця польова
- Грицики звичайні
- Дворядник, види
- Дурман звичайний
- Осот, види
- Нетреба звичайна (2 листки)
- Жовтозілля звичайне
- Зірочник середній
- Канатник Теофраста
- Кропива глуха
- Кучерявець Софії
- Лобода, види
- Підмаренник чіпкий
- Празелень звичайна
- Редька дика
- Ромашка, види
- Рутка лікарська
- Свиріпа звичайна
- Талабан польовий
- Триреберник
- Щириця, види, окрім АЛС резистентних популяцій
- Падалиця традиційного соняшнику, ріпаку
- Лутига розлога
- Мак дикий
- Морква дика
- Незабудка польова
- Жабрій, види

Проблеми забур'яненості в посівах соняшнику



РЕКОМЕНДОВАНО ВИДИ:

- 1) Лободи
- 2) Осотів
- 3) Амброзії
- 4) Гірчаків
- 5) Пасльонів
- 6) Дурману
- 7) Капустяних
- 8) Нетреби

Експрес® 75 ВГ – ефективний контроль найбільш проблемних двосім'ядольних бур'янів!




Експрес® 75 ВГ - розширене вікно застосування

ВАЖЛИВО: опт. контроль на ранній стадії розвитку АМБРОЗІЇ (сім'ядоль -1 ша пара)



Експрес® 75 ВГ
50 г/га
+ ПАР Тренд® 90
- 0,25-0,3 л/га

2 - 8 СПР. ЛИСТКІВ



РАННЯ ПОЯВА КАПУСТЯНИХ БУР'ЯНІВ?





РЕЗУЛЬТАТ НЕХТУВАННЯ КАПУСТЯНИХ БУР'ЯНІВ



ПРОБЛЕМА РЕДЬКИ ДИКОЇ ТА КАПУСТИ ПОЛЬОВОЇ

Чернігівська область

Двократне застосування гербіциду Експрес® 75 ВГ



Дія Експрес® 75 ВГ 45 г/га + ПАР Тренд® 90 0,25 л/га на види бур'янів.
Миколаївська обл., Первомайський р-н



Експрес® 75 ВГ

Дія Експрес® 75 ВГ 45 г/га + ПАР Тренд® 90 0,25 л/га на види бур'янів.
Миколаївська обл., Первомайський р-н





Експрес® 75 ВГ
30г/га+ ПАР
Тренд® 90 0,3
л/га
Амброзія
сім'ядолі-2
листки, лобода,
нетреба



**Експрес® 75 ВГ
30г/га+ ПАР
Тренд® 90 0,3
л/га
Дія на нетребу**



Київська обл., Броварський р-н, обробка- 11.05, фото- 25.05




**Експрес® 75 ВГ
30г/га+ ПАР
Тренд® 90 0,3
л/га
Дія на
амброзію-
сім'ядолі- 2
листки**




Київська обл., Броварський р-н, обробка- 11.05, фото- 25.05

Ефективність

Контроль



Експрес® 75 ВГ 30г/га+
ПАР Тренд® 90 0,3 л/га



Контроль

Київська обл., Броварський р-н, обробка- 11.05, зліва фото- 25.05, справа- через 10 днів

Система захисту соняшнику з ґрунтовим гербіцидом

Ґрунтовий
гербіцид

Експрес® 75 ВГ 40-
50 г/га + ПАР
Тренд® 90 0,25-0,3
л/га



Система захисту соняшнику без ґрунтового гербіциду

Експрес® 75 ВГ 35-50
г/га + ПАР Тренд® 90
0,25-0,3 л/га

Грамініцид
через 7-10 днів



Експрес® 75 ВГ

FMC | An Agricultural
Sciences Company



**Дія Експрес® 75 ВГ 45
г/га + ПАР Тренд® 90
0,3 л/га.
Київська обл.,
Білоцерківський р-н,
13 діб після обробки**




**Дія Експрес® 75 ВГ 45
г/га + ПАР Тренд® 90
0,3 л/га.
Київська обл.,
Білоцерківський р-н,
13 діб після обробки**

Експрес® 75 ВГ 45 г/га + ПАР Тренд® 90 0,3 л/га.

Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, Обробка 27.05.2018, фото 14.06.2018



Експрес® 75 ВГ: дія на злакові бур'яни?



Без обробки



Експрес® 75 ВГ 45 г/га + ПАР Тренд



УВАГА: дія Експрес® 75 ВГ у нормі 50 г/ га + ПАР Тренд® 90 на злакові бур'яни не завжди може бути достатньою. Тому може знадобитися додатковий контроль злаків препаратами грамініцидами.

Не експериментуйте!



Одеська обл. 2019 р. генеричний продукт з д.р. трибенурон-метил, 750 г/кг

Переваги технології Експрес® 75 ВГ

- Надає можливість післясходового контролю широкого спектру дводольних бур'янів
- Висока ефективність проти видів лободи, осотів, щириці, дурману та хрестоцвітих
- Висока селективність до спеціалізованих гібридів соняшнику
- Широке вікно застосування (від 2 до 8 листків культури)
- Допомагає розкрити потенціал культури
- Без обмежень у сівозміні
- Висока економічна рентабельність у порівнянні іншими технологіями





**ЛГ59580,
ЛГ50479 СХ,
ЛГ50529 СХ,
ЛГ50549 СХ,
ЛГ50779 СХ,
ЛГ50639 СХ,
ЛГ50689 СХ,
ЛГ50449 СХ,
ЛГ50489 СХ**

Портфоліо стійких до Експрес® 75 ВГ гібридів



**П63ЛЕ166,
П64ЛЕ137,
П64ЛЕ185,
П64ЛЕ168,
П64ЛЕ25,
П64ЛЕ269,
П64ЛЕ145,
П64ЛЕ163,
П64ЛЕ280,
П64ГЕ418,
П63ГЕ189,
П64ГЕ188,
П64БЕ800**



**САЙБЕРІК HTS,
СУБАРО HTS,
СУЗУКА HTS,
СУМІКО HTS,
СУОМІ HTS,
СУРЕЛІ HTS,
СУРЕСТ HTS.
СУЛІАНО HTS,
СУНАРІС HTS,
СУВОРА HTS**

Lidea
FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE

**ЦЕЙЛОН СУ,
ЕС ЛОНДОН СУ,
5053Л СУ,
ЕС АРМОНІКА,
ЕС АРОМАТІК**



MAS 83.SU
MAS 85.SU



M94C35

- Для забезпечення максимальної селективності щодо культури **НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** змішувати **Експрес® 75 ВГ** з грамініцидами.
- Для контролю злакових бур'янів рекомендується :
 - проводити знищення злакових бур'янів:
 - За допомогою ґрунтових гербіцидів (до сходів);
 - За або через **5-6 днів після внесення Експрес® 75 ВГ**
- Дотримуватися такого ж розриву в 5-6 днів між внесеннями з фосфорорганічними інсектицидами
- В спекотливу погоду обприскування проводити лише у вечірні та нічні години

- Не застосовуйте Експрес® 75 ВГ якщо культура знаходиться в стресовому стані:
 - внаслідок посухи або перезволоження ґрунту,
 - якщо відбувається значне коливання денної і нічної температури повітря,
 - якщо соняшник знаходиться в стані стресу від нестачі поживних речовин, ушкодження заморозками, шкідниками, градом, раніше застосованих гербіцидів або за інших фізичних ушкоджень рослин.
- Не застосовуйте Експрес® 75 ВГ якщо температура нижча, ніж +10°C або вище, ніж +25°C.
- Не застосовуйте Експрес® 75 ВГ після великого дощу протягом щонайменше 3 днів або до часу, коли надлишок вологи не вийде з ґрунту.
- Не застосовуйте Експрес® 75 ВГ в кількості понад 50 г/га за сезон.

Контроль падалиці Експрес-стійкого соняшнику

- Для контролю падалиці **Експрес® 75 ВГ** або **Експрес® Голд 75 ВГ** стійкого соняшнику в наступних культурах сівозміни рекомендується використовувати:
- на зернових культурах:
 - **Фаместра®**. Інші гербіциди, такі як **Гранстар® Голд**, **Калібр®**, **Еллай Супер®** в бакових сумішах з гербіцидами на основі д.р. флорасулам, флуороксипір, дикамба, 2,4-Д, 2М-4Х, карфентразон, клопіралід
- на кукурудзі:
 - **Хармоні®**, **Нікіт®**, в бакових сумішах з гербіцидами на основі д.р. 2,4-Д, флорасулам, дикамба, клопіралід
- на сої:
 - **Комманд®**, або д.р. бентазон



ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ



Данадим® Мікс 0,8-1,5 л/га

Фуфанон® 0,6-0,8 л/га

Джалентра® 0,3-0,4 л/га

Кораген® 0,15-0,175 л/га

Вантекс 0,1 л/га

Імпакт® К 0,8-1,0 л/га

Тремізія™ 0,4-0,5 л/га

Семафор®
2,0-2,5 л/т


Пікус
8,0-12,0 л/т

Саксесор™
1,5-2,0 л/га

Експрес® Голд 75 ВГ
20-50 г/га + ПАР
Тренд® 90 0,3 л/га

Експрес® Голд 75 ВГ 35-
40 г/га + ПАР Тренд®
90 0,3 л/га

Сальса® 25 г/га + ПАР
Тренд® 90 0,3 л/га



00

09

10

12

19

51

57

59

61

63

65

69

85

Шукайте детальну інформацію на нашому сайті

www.fmc.com.ua

та завантажуйте електронний каталог FMC



**Повне портфоліо компанії
завжди під рукою**

*Завантажуйте та будьте
постійно на зв'язку з нами!*

