

Саксессор™

Гербицид




ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРБИЦИДУ САКСЕССОР™

Діюча речовина	петоксамід - 600 г/л
Препаративна форма:	концентрат емульсії
Норма використання:	1,5- 2,0 л/га
Хімічний клас:	хлорацетаміди
Пакування канистра:	5 та 10 л
Термін зберігання:	2 роки

НОВИЙ МЕХАНІЗМ ДІЇ

Ґрунтовий гербицид **Саксессор™** містить абсолютно нову на ринку України діючу речовину петоксамід з групи хлорацетамідів виробництва компанії **FMC**. Після поглинання діючої речовини через коріння, гіпокотиль і сім'ядолі він пригнічує біосинтез ліпідів у бур'янах. **Саксессор™** ефективно контролює види проса, зокрема куряче, видів ромашки, лободи та низки інших бур'янів.



ПЕРЕВАГИ ГЕРБИЦИДУ

- Нова на ринку діюча речовина - петоксамід
- Гнучкий у фазах застосування- на ріпаку та кукурудзі може використовуватись досходово та ранньопіслясходово, сумісний з іншими гербицидами
- Тривала захисна дія до 6 тижнів попереджає проростання однодольних та дводольних бур'янів. Не потребує заробки в ґрунт
- Інструмент в боротьбі з резистентними популяціями бур'янів на низці культур

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ САКСЕССОР™


Культура	Норма витрати препарату	Спектр дії	Спосіб та строки застосування	Кратність обробок
Кукурудза на зерно (окрім цукрової та ділянок гібридизації)	1,5- 2,0 л/га	Одно- та дводольні бур'яни	1) ґрунтового- після посіву до появи сходів кукурудзи 2) ранньопіслясходово в фазі 2-4 листки кукурудзи включно	1
Ріпак	1,5- 2,0 л/га	Одно- та дводольні бур'яни	1) ґрунтового- після посіву до появи сходів ріпаку 2) ранньопіслясходово до фази 4 справжні листки ріпаку включно	1
Соняшник	1,5- 2,0 л/га	Одно- та дводольні бур'яни	ґрунтового- після посіву до появи сходів	1

САКСЕССОР™ – СПЕКТР КОНТРОЛЬОВАНИХ БУР'ЯНІВ

Амброзія полинолиста	Лобода біла
Вероніка персидська	Мак дикий
Вівсюг звичайний	Мак польовий
Воловик польовий	Мишій, види
Волошка синя	Незабудка польова
Галінсога дрібноквіткова	Нетреба звичайна
Герань маленька	Осот городній (з насіння)
Герань розсічена	Осот рожевий (з насіння)
Гібіск трійчастий	Пальчатка
Гірчак березкоподібний	Паслін чорний
Гірчиця польова	Підмаренник чіпкий
Горошок мишачий	Роман польовий
Грицики звичайні	Ромашка види
Гірчак шорсткий	Рутка лікарська
Дурман звичайний	Сорго алепське
Жовтозілля звичайне	Спориш звичайний
Зірочник середній	Талабан польовий
Канатник Теофраста	Тонконіг звичайний
Кропива глуха	Фіалка польова
Куряче просо	Щириця жминдовидна
Курячі очка польові	Щириця розлога, звичайна
Лептохлоа різноманітна	Щириця, види

■ ефективність понад 90% ■ 75-90%

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИ КЛЮЧОВИХ БУР'ЯНІВ




Саксесор™

Гербицид




СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ ЕКСПРЕС™




САКСЕССОР™ У ТЕХНОЛОГІЯХ ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ

Гербицид **Саксесор™** необхідно застосовувати до сходів кукурудзи або після сходів в фазу 2-4 листки. Фаза розвитку бур'янів є ключовою для визначення часу застосування. Оптимальна ефективність найкраще досягається шляхом застосування до або під час сходів бур'янів.



САКСЕССОР™ НА ОЗИМОМУ РІПАКУ (Програма максимального захисту)



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ САКСЕССОР™

- Саксесор™ ефективний як проти злакових, так і проти різноманітних дводольних бур'янів.
- Основними вимогами для якісної роботи препарату є достатня вологість ґрунту та добре підготовлений ґрунт.
- Велика кількість поживних залишків, які залишаються на поверхні, мають негативний вплив на ефективність.
- Бур'яни, які вже проросли, контролюються до стадії сім'ядолей (макс. стадія 2 листків), бур'яни, які проростають пізніше, утримуються залишковим ефектом, який триває до 6 тижнів.
- При обприскуванні в умовах низької вологості ґрунту, гербицид має здатність реактивуватися, якщо опади пройшли впродовж 14 днів після застосування.