

Пойнтер®

ЗАВЖДИ ВЧАСНО

Завжди вчасно. Післясходовий гербіцид для контролю широкого спектру дводольних бур'янів у посівах зернових колосових культур.

ОПИС ПРЕПАРАТУ:

Діючі речовини:

Трибенурон-метил 750 г/кг

Норма використання:

15-25 г/га

Препаративна форма:

Водорозчинні гранули (в.г.)

Реєстрація:

Озима та яра пшениця

Ячмінь ярий та озимий

Жито, овест, тритікале та просо

Пакування: Пластмасова банка

500 г

РЕЄСТРАЦІЯ

Культура	Норма витрати	Спектр дії	Фаза внесення	Кратність обробок
Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий	15-25 г/га	Чутливі дводольні бур'яни (в т.ч. осоти, підмаренник чіпкий)	Від фази 2-3 листків до прапорцевого листка культури	1 за сезон
Жито	20-25 г/га			
Овес, тритікале, просо	15-20			

- **Діюча речовина** гербіциду **Пойнтер**[®] належить до групи АЛС інгібіторів
- Проникаючи в бур'ян, **Пойнтер**[®] **блокує фермент ацетолактатсинтазу (АЛС)**, внаслідок чого зупиняється синтез ферментів лейцин, ізолейцин та валін
- Клітини бур'янів у точках росту втрачають можливість до поділу, внаслідок чого **припиняється ріст бур'янів** і вони не створюють конкуренцію культурній рослині
- Видимі симптоми з'являються через 5-8 днів після внесення гербіциду, а повна загибель бур'янів настає через 12-21 дні

- **Ефективність проти широкого спектру важкоконтрольованих бур'янів, особливо таких як види осоту, підмаренник чіпкий та ін.**
- **Пойнтер® – завжди вчасно: широке вікно внесення – від появи 2-3-х листків (в т.ч. В осінній період) до прапорцевого листка культури.**
- **Низька норма внесення (15–25 г/га), що забезпечує простоту та зручність у використанні**
- **Ефективний від +5°C (середньодобова)**
- **Відсутність жодних обмежень у сівозміні дасть змогу вибрати наступну культуру за Вашим**
- **Бажанням**
- **Швидкість дії: зупинка росту бур'янів через 2–3 години, загибель через 2–3 тижні**
- **Сумісний з більшістю пестицидів, що дає змогу застосовувати Пойнтер® у комплексному захисті**
- **Дощ, що випав через три години після обробки, не знижує ефективності препарату**

- **Ефективний проти однорічних бур'янів.**

Пойнтер® зазвичай є більш ефективним, коли його використовують на ранніх стадіях розвитку активно вегетуючих бур'янів. Важливо контролювати стадію розвитку бур'янів, щоб визначити найбільш ефективний період для використання Пойнтеру®.


- **Ефективний проти багаторічних бур'янів.**

Пойнтер® контролює ключові багаторічні бур'яни у посівах зернових, в тому числі осот рожевий. Системна дія Пойнтеру® дає змогу проникати через листя до коренів та різом. Оскільки Пойнтер® поглинається листям, його слід використовувати в той час, коли всі бур'яни зійшли і добре розвинулись. Найкращий період контролю осоту рожевого у фазі розетки — початку стеблуння.

Чутливі двосім'ядольні бур'яни (норма внесення — 20 г/га)

Біфора промениста (*Bifora radians*)
Гірчиця, види (*Sinapis spp.*)
Горошок, види (*Vicia spp.*)
Грицики звичайні (*Capsella bursa-pastoris*)
Дворядник, види (*Diplotaxis spp.*)
Жабрій, види (*Galeopsis spp.*)
Жовтець, види (*Ranunculus spp.*)
Жовтозілля звичайне (*Senecio vulgaris*)
Зірочник середній (*Stellaria media*)
Злінка канадська (*Erigeron canadensis*)
Кропива, види (*Lamium spp.*)
Куколиця, види (*Melandrium spp.*)
Кучерявець, види (*Descurainia spp.*)
Латук (Молокан), види (*Lactuca spp.*)
Мак дикий (*Papaver rhoeas*)

Міагрум пронизанолистий (*Myagrum perfoliatum*)
Незабудка польова (*Myosotis arvensis*)
Осот, види (*Cirsium spp.*)
Переліска, види (*Mercurialis spp.*)
Приворотень польовий (*Aphanes arvensis*)
Редька дика (*Raphanus raphanistrum*)
Роман, види (*Anthemis spp.*)
Ромашка, види (*Matricaria spp.*)
Соняшник, падалиця (*Heliantus annuus*)
Сухоребрик, види (*Sisymbrium, spp.*)
Талабан польовий (*Thlaspi arvense*)
Фіалка польова (*Viola arvensis*)
Хрінниця, види (*Lepidium spp.*)
Шпергель звичайний (*Spergula arvensis*)
Падалиця ріпаку (*Brassica napus*)






Чутливі двосім'ядольні бур'яни (норма внесення — 25 г/га)

Гречка витка березковидна (*Polygonum convolvulus*)
Калачики непомітні (*Malva neglecta*)
Королиця, види (*Chrysanthemum* spp.)
Кульбаба лікарська (*Taraxacum officinale*)
Лобода біла (*Chenopodium album*)
Осот жовтий (польовий) (*Sonchus arvensis*)
Підмаренник чіпкий (3-4 міжвузля) (*Galium aparine*)
Щавель, види (*Rumex* spp.)

Середньчутливі двосім'ядольні бур'яни (норма внесення — 25 г/га)

Амброзія (сім'ядолі - 2 листки) (*Ambrosia artemisiifolia*)
Волошка синя (до 5 см) (*Centaurea cyanus*)




СЕЛЕКТИВНІСТЬ ТА ГНУЧКІСТЬ


Селективний до пшениці та ячменю від стадії 2-3 листків до прапорцевого листка включно

Пойнтер®

Ефективний від +5° С середньодобової температури



ФМС ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ



FMC ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ЯЧМЕНЮ

Пікус
0,3-0,85 л/т


Вінцит® Форте
1,25 л/т

Імпакт® 500 0,25 л/га

Фаместра® 20-30 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га

Калібр® 40-50 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га

Пойнтер® 15-25 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га



Шукайте детальну інформацію на нашому сайті

www.fmc.com.ua

та завантажуйте електронний каталог FMC



**Повне портфоліо компанії
завжди під рукою**

*Завантажуйте та будьте
постійно на зв'язку з нами!*

