



Фаместра®
Інсектицид

ДІЯ НА ЛОБОДУ БІЛУ

Фаместра® 30 г/га
+ Тренд 0,3 л/га

Київська обл.,
Фастівський р-н, травень
2019.



фото 4.10.2020

ДІЯ НА ПАДАЛИЦЮ РІПАКУ

Фаместра® 30 г/га
+ Тренд 0,3 л/га

1. Кіровоградська обл.,
квітень 2019.
Обробка 17.05

2. Одеська обл.,
10.11.2020.
Обробка 28.10



10 днів після обробки

12 днів після обробки

ДІЯ НА ТАЛАБАН ПОЛЬОВИЙ

ДІЯ НА КУЧЕРЯВЕЦЬ СОФІЇ

Фаместра® 30 г/га + Тренд 0,3 л/га



10 днів після обробки

Кіровоградська обл.,
квітень 2019. Обробка 17.05



10 днів після обробки

Кіровоградська обл.,
квітень 2019. Обробка 17.05



12 днів після обробки

Одеська обл., листопад 2020



**ШВИДКО
ДОСТУПНО
ЦІКАВО**

Долучайтесь до нас
у соціальних мережах

За консультаціями та з питань придбання звертайтеся
до регіональних керівників та представників компанії FMC

Керівник регіону Захід

Андрій Кучерявий
(066) 797 45 43

Хмельницька,
Вінницька,
Житомирська, Київська,
Волинська, Рівненська,
Тернопільська,
Закарпатська, Івано-
Франківська, Львівська,
Чернівецька, Одеська
області

Керівник регіону Захід

Олексій Дворський
(050) 324 00 03

Черкаська,
Кіровоградська,
Дніпропетровська,
Донецька,
Миколаївська,
Херсонська, Запорізька,
Чернігівська, Сумська,
Полтавська, Луганська,
Харківська області

Регіональні представники

Бай Ярослав	Рівненська, Волинська обл.	(066) 721 41 25
Шмига Руслан	Хмельницька та Чернівецька обл.	(050) 950 74 01
Продіус Микола	Київська обл.	(050) 411 32 91
Кучма Олександр	Тернопільська та Ів.-Франківська обл.	(050) 398 30 99
Мотрук Сергій	Одеська обл.	(095) 284 95 09
Ільницький Олександр	Львівська та Закарпатська обл.	(095) 800 10 34
Стефанко Ігор	Миколаївська обл.	(095) 800 10 54
Яровий Володимир	Харківська, Луганська обл.	(095) 284 95 01
Рябка В'ячеслав	Дніпропетровська, Донецька обл.	(095) 284 95 03
Заковоротний Олександр	Сумська обл.	(050) 471 44 32
Клименко Євген	Полтавська обл.	(050) 355 90 02
Гвоздь Олександр	Черкаська обл.	(050) 982 04 28
Курцев Володимир	Кіровоградська обл.	(050) 419 29 63
Салгалов Олексій	Херсонська обл.	(095) 284 95 14
Плаксін Віталій	Запорізька обл.	(050) 312 01 96
Здор Сергій	Чернігівська обл.	(050) 435 82 86
Кіндер Олександр	Житомирська обл.	(050) 634 41 06
Асауленко Володимир	Вінницька обл.	(066) 591 27 50
Паламарчук Костянтин	Вінницька обл.	(066) 380 90 31

Центральний офіс

Салієнко Володимир	Менеджер із захисту польових культур	(050) 410 19 18
Рубанка Тарас	Спеціаліст із захисту овочевих культур	(050) 356 99 76
Желеф Альона	Спеціаліст із маркетингових комунікацій	(050) 386 98 55
Балас Вікторія	Менеджер з розвитку проєктів	(050) 492 24 20

WWW.FACEBOOK.COM/FMCUA

WWW.FMC.COM.UA

Коли у бур'янів
«зв'язані руки»

FMC | An Agricultural
Sciences Company



Фаместра®

Гербицид

Післясходовий гербицид для ефективного контролю широкого спектра двосім'ядольних бур'янів,
зокрема всіх видів падалиці соняшнику та традиційної падалиці ріпаку, підмаренника чіпкого, видів осотів.

БУДЬ ЛАСКА ЗАСТОСОВУЙТЕ ПРОДУКТИ ВІДПОВІДАЛЬНО ТА БЕЗПЕЧНО.
ДОТРИМУЙТЕСЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ВИРОБНИКА, ЩО ВКАЗАНІ НА ЕТИКЕТЦІ.

Фаместра®
Інсектицид

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСЕКТИЦИДУ ФАМЕСТРА®

Комбінований післясходовий гербіцид для ефективного контролю широкого спектру двосім'ядольних бур'янів, зокрема всіх видів падалиці соняшнику та традиційної падалиці ріпаку, підмаренника чіпкого, видів осотів

Діюча речовина	Трибенурон-метил 600 г/кг + флорасулам 200 г/кг
Хімічний клас	Сульфонілсечовини + Триазолпіримідини
Препаративна група	Водорозчинні гранули
Розподіл у рослині	Системний
Упаковка	Пластикові банки 250 г
Гарантійний термін зберігання	3 роки

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Норми витрати препарату, г/га	Спектр дії	Спосіб та строки застосування	Кратність обробок
Пшениця, Ячмінь	20-25 + ПАР Тренд 90 0,25-0,3 л/га	Однорічні та багаторічні дводольні (у фазі 2-6 листків)	Обприскування культури від фази 2-3х листків по прапорцевий лист	1 за сезон
Пшениця, Ячмінь	25-30 + ПАР Тренд 90 0,25-0,3 л/га	Однорічні та багаторічні дводольні (у фазі розетки)+підмаренник чіпкий (до 4-х кілець)		

Норма витрати робочої рідини - 200-300 л/га

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Гербіцид варто застосовувати при температурі від +8°C до +25°C при активній вегетації бур'янів
- Для отримання максимальної ефективності обприскування виконувати на ранніх фазах розвитку бур'янів
- Не варто застосовувати гербіцид при наявності на листках роси для запобігання стікання препарату з їх поверхні
- Обприскування посівів варто робити у безвітряну погоду, ранкові або вечірні години, забезпечуючи рівномірне покриття листової поверхні бур'янів
- Обов'язково потрібно додавати ПАР **Тренд® 90** 0,25-0,3 л/га і використовувати максимальну норму витрати **Фрагма™** Макс та робочої рідини

Фаместра®
Інсектицид

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ


- Відмінне рішення для контролю падалиці традиційного ріпаку, всіх видів падалиці соняшнику, в т.ч. ІМІ та стійкого до **Експрес™** 75 в.г., підмареннику чіпкого, видів осотів
- Висока біологічна ефективність проти бур'янів, стійких до 2,4Д та МЦПА.
- Оподи, що випали через 2 год після обприскування, не знижують ефективність дії препарату.
- Висока селективність до культурних рослин.
- Широке технологічне вікно у строках застосування.
- Можливість застосування у широкому діапазоні температур повітря і вологості.
- Застосування у всіх типах сівозмін без обмежень.
- Низька норма витрати препарату на гектар.

СЕЛЕКТИВНІСТЬ ТА ГНУЧКІСТЬ

Селективний до пшениці та ячменю від фази 2-3 листків по прапорцевий лист

Фаместра®

Ефективний від +8 °C середньодобової температури



ЗОСЕРЕДЖЕНИЙ НА ЧИСТОТІ ПОСІВІВ!

Трибенурон-метил	+	Флорасулам	=	ФАМЕСТРА®
Осот, види Кульбаба лікарська Щавель, види Лобода біла Ромашка, види Мак, види Капустяні види бур'янів		Падалиця соняшнику, у т.ч. технології Експрес™ та Clearfield Підмаренник чіпкий Амброзія полинолиста Ромашка, види Мак дикий Волошка синя Гірчак, види Капустяні види бур'янів		Падалиця соняшнику, у т.ч. технології Експрес™ та Clearfield Осот, види Підмаренник чіпкий Лобода біла Ромашка, види Мак дикий Кульбаба лікарська Щавель, види Волошка синя Гірчак, види Капустяні види бур'янів

Фаместра®
Інсектицид

ДІЯ НА ПАДАЛИЦЮ СОНЯШНИКУ ЕКСПРЕС

Фаместра® 30 г/га
+ Тренд 0,3 л/га

Київська обл.,
Фастівський р-н,
травень 2019




10 днів після обробки

ДІЯ НА ПАДАЛИЦЮ СОНЯШНИКУ CLEARFIELD

Контроль (К)
Фаместра® 30 г/га
+ Тренд 0,3 л/га (Ф)

Дніпропетровська обл.,
Дніпропетровський р-н,
Обробка 17.05.2019



23.05.2019


23.05.2019

01.06.2019

ДІЯ НА ПІДМАРЕННИК ЧІПКИЙ

Фаместра® 30 г/га
+ Тренд 0,3 л/га (Ф)

Дніпропетровська обл.,
Дніпропетровський р-н,
Обробка 17.05.2019



23.05.2019

23.05.2019

01.06.2019

ДІЯ НА ОСОТ ГОРОДНІЙ

Контроль (К)
Фаместра® 30 г/га
+ Тренд 0,3 л/га (Ф)

Дніпропетровська обл.,
Дніпропетровський р-н,
Обробка 17.05.2019



23.05.2019

23.05.2019

01.06.2019