

Вінцит® Форте

Потрійний захист і контроль

Фунгіцидний протруйник для надійного захисту насіння і сходів від широкого спектру хвороб.

Це поєднання трьох системних діючих речовин, які активно викоринують насінневу та ґрунтову інфекції, а також запобігають зараженню хворобами рослин під час проростання.



Діюча речовина	Хімічна група	Препаративна форма	Розподіл у рослині	Пакування	Гарантійний термін зберігання
флутриафол 37,5 г/л + тіабендазол 25 г/л + імазаліл 15 г/л	триазоли + бензимидазоли + імідазоли	концентрат суспензії	системний	каністра 5 л	2 роки

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІНЦИТ® ФОРТЕ

- Захищає рослину від широкого комплексу хвороб
- Викоринює насінневу та ґрунтову інфекції, запобігає аерогенному зараженню
- Швидко лікувальна та подовжена профілактична дія
- Швидке проникнення у рослину та потрапляння у тканини, що ростуть
- Стимулює ріст і розвиток кореневої системи
- Допомагає рослині сформувати максимальну кількість продуктивних пагонів
- Не виявляє фітотоксичності, навіть за умов посухи
- Зберігає біологічну активність у сухому ґрунті
- Забезпечує збереження кількості та якості вашого врожаю
- Використання гарантує високий рівень рентабельності

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА СПЕКТР ДІЇ

Пшениця	Ячмінь	Жито	Соя	Горох
1,0-1,2 л/т	1,25 л/т	1 л/т	1,0-1,25 л/т	1,0-1,25 л/т

Фузаріозні, гельмінтоспоріозні, пітєві кореневі гнилі, снігова пліснява, сажкові хвороби, борошниста роса, пліснявіння насіння

Пліснявіння насіння, фузаріозна коренева гниль, аскохітоз



ОСОБЛИВА ФОРМУЛЯЦІЯ

Вінцит® Форте має формуляцію концентрат суспензії. Протруйник відмінно розчиняється у воді і забезпечує високу стабільність розподілу діючих речовин у робочому розчині (відсутні ризики кристалізації, піноутворення)

ПЕРЕВАГИ ФОРМУЛЯЦІЇ

- Хімічна стабільність формуляції препарату забезпечує надійний і тривалий захист сходів
- Препарат не викликає фітотоксичності навіть в екстремальних умовах
- Глибина загортання насіння та нестача вологи у ґрунті не впливають на біологічну активність препарату
- Прискорює кущення та сприяє розвитку міцної кореневої системи



ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВІНЦИТ® ФОРТЕ У БАКОВИХ СУМІШАХ


Застосування Вінцит® Форте в сумішах з інсектицидними протруйниками, зокрема Пікус®, у рекомендованих нормах забезпечує захист культури від комплексу хвороб та шкідників.

Приклади найбільш розповсюджених баккових сумішей:
Вінцит® Форте (1-1,2 л/т) + Пікус® (0,5-0,85 л/т) - пшениця
Вінцит® Форте (1,1-1,25 л/т) + Пікус® (0,5-0,85 л/т) - ячмінь

Всі три діючі речовини з різних хімічних груп, що значно розширює спектр дії на патогенів (включно з несправжніми грибами) та запобігає виникненню резистентності хвороб.

Активні компоненти препарату набувають мобільності у насінні, що проростає, у сходах і кореневій системі рослин за рахунок високої системності.

СИНЕРГІЗМ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ВІНЦИТ® ФОРТЕ



- Флутриафол
- Імазаліл
- Тіабендазол
- Вінцит® Форте

Потрійний захист і контроль

ПОТЕНЦІЙНІ ВТРАТИ ВРОЖАЙНОСТІ ВІД ХВОРОБ

до 60% до 40% до 30%



Летюча сажка пшениці / ячменю
(*Ustilago tritici / nuda*)

Пряма шкода - знищення зерна. Також у хворих рослин спостерігається зменшення маси (до 32%) і висоти (до 13%) стебел, послаблення кущення (до 11%).



Септоріоз
(*Septoria nodorum*)


Знижується схожість насіння. Зараження спричиняє відставання рослин у рості, передчасного засихання листків і дозрівання хлібів, зменшення довжини і виповненості колоса, щуплості зерна, зменшення маси тисячі зерен, вилягання рослин.



Фузаріозна коренева гниль
(види р. *Fusarium*)

При використанні зерна у хлібопекарській промисловості і на фуражні цілі не допускається вміст фузаріозного зерна понад 1%.

Ефективність протруйника **Вінцит® Форте** у контролі основних хвороб сої



ЗАСТОСУВАННЯ НА СОЇ:

Аскохітоз. Основне джерело інфекції – це уражене насіння. Аскохітоз є причиною випадання молодих і дорослих рослин, зменшення врожаю зерна сої можуть бути до 25%. Інфікування рослин аскохітозом може відбуватися як під час проростання вже ураженого насіння, так і під час вегетації рослини сої. Найсильніше уражує сою у фазі сходів, наступний етап – це цвітіння/плодоутворення.

Фузаріоз сої проявляється у вигляді загнивання насіння під час його проростання, потім починаються кореневі гнилі. В результаті цієї хвороби молода рослина в'яне та гине точка росту. Далі, перед дозріванням сої, захворювання спричиняє знебарвлення ступок бобів з утворенням на них помаранчевого нальоту. Зерно в уражених бобах плюскле, зморшкувате, часто вкрите білуватим нальотом. Насіння втрачає схожість і дає інфіковані сходи.


РОЗГЛЯНЕМО ДЕТАЛЬНІШЕ, ЯКІ Ж САМЕ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ ВІНЦИТ® ФОРТЕ ПРАЦЮЮТЬ ПРОТИ ПОШИРЕНИХ ХВОРОБ СОЇ:

Тіабендазол (бензімідазол) – використовується в якості протруйника проти фузаріозів та фомопсису (раку стебла сої).

Імазаліл (імідазол) – виявляє локально-системну дію, захищає корені рослини. Контролює збудників пліснявинної насіння різної етіології, також має високу ефективність проти фузаріозної кореневої гнилі і патогенів, стійких до бензімідазолів. На біохімічному рівні дія імазалілу заснована на інгібуванні синтезу ергостерину у мембранах клітин, що впливає на проникність клітинних мембран фітопатогенів.

Флутриафол (триазол) – працює проти фузаріозів, церкоспорозу сої (пурпурового), який передається з насінням, та проти якого флутриафол є еталоном, септоріозу (бурої плямистості) та вугільної гнилі сої. Флутриафол є дуже системним і за проростання насіння може тривалий час зберігатися в ґрунті. Потім флутриафол поглинається коренями рослини і дуже швидко переміщується всередину рослини, коли вона росте. Таким чином забезпечується системна та тривала дія.


Норма витрати робочого розчину для бобових: 4-5 л/т



ВІНЦИТ® ФОРТЕ:

НАДІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ НАСІННЕВОЇ ІНФЕКЦІЇ

- Тверда сажка пшениці
- Кам'яна сажка ячменю
- Покрита сажка вівса
- Стеблова сажка
- Летюча сажка вівса
- Плісняві гриби
- Снігова пліснява
- Гельмінтоспоріоз
- Септоріоз
- Фузаріози
- Летюча сажка пшениці та ячменю



- Чубок
- Плодова оболонка (перикарпій)
- Насіннева оболонка (периспермій)
- Алейроновий шар
- Ендосперм
- Зародок

Вінцит® Форте

Фунгіцидний протруйник

Фунгіцидний протруйник для надійного захисту насіння і сходів від широкого спектру хвороб

БУДЬ ЛАСКА ЗАСТОСОВУЙТЕ ПРОДУКТИ ВІДПОВІДАЛЬНО ТА БЕЗПЕЧНО. ДОТРИМУЙТЕСЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ВИРОБНИКА, ЩО ВКАЗАНІ НА ЕТИКЕТЦІ.