

Знаний колекціонер шкідників

FMC | An Agricultural Sciences Company



Яблунова плодожерка
Cydia pomonella



Шкідлива черепашка
Eurygaster integriceps



Квідоїд ріпаковий
Meligethes aeneus



Совка озима
Agrotis segetum



Хлібний жук
Anisoplia austriaca



Прихованохоботник
Ceutorhynchus napi



Горохова зернівка
Bruchidius incarnatus



Буряковий довгоносик
Asproparthenis punctiventris

Фуфанон®

Інсектицид

Високоєфективний інсектоакарицид з сильною контактною дією, а також з потужним фумігаційним ефектом.

Фуфанон®

Діюча речовина:	малатіон, 570 г/л
Препаративна форма:	Концентрат емульсії
Хімічний клас	фосфорорганічні сполуки
Розподіл у рослині	контактний

Миттєва дія на шкідників

Високоєфективний інсектоакарицид з сильною контактною дією та потужним фумігаційним ефектом.



Культура	Норма, л/га	Спектр дії
Пшениця озима	1,2	Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, попелиці
Горох	0,5-1,2	Горохова плодожерка, попелиці
Ріпак	0,6-0,8	Ріпаковий квіткоїд, пильщик, білан, листоїд, хрестоцвіті клопи, оленка волохата
Буряки цукрові	1,0-2,0	Попелиця листкова, блішки, муха і міль мінуючі, довгоносики
Яблуня	2,0	Листоїдна гусінь, кліщі, щитівки, оленка волохата
Виноградники	1,0	Кліщі, листовійки, червиці
Соняшник	0,6-0,8	Попелиця, лучний метелик
Капуста	1,2	Капустна попелиця, білан, совки



Звичайний буряковий довгоносик



Попелиці



Мухи




Лускокрилі



Листогризучі жуки



Цикадки



Звичайний буряковий довгоносик,

сірий буряковий довгоносик,

блішки,

ЩИТОНОСКИ

1,5 л/га

період очікування - 20 днів



**Клоп шкідлива черепашка,
Хлібні жуки,
Жужелиця (турун),
П'явиця,
Злакові попелиці**

**1,2 л/га - пшениця озима,
період очікування - 20 днів**

- ✓ ефективний проти широкого спектру шкідників на різних культурах
- ✓ висока швидкість контактної дії (від декількох секунд до декількох хвилин)
- ✓ володіє акарицидною дією
- ✓ надійний засіб для контролю шкідників, які знаходяться у важкодоступних місцях
- ✓ тривалий захисний ефект
- ✓ контактна і потужна фумігаційна дія
- ✓ діюча речовина після обприскування протягом декількох днів розкладається на безпечні хімічні сполуки.

ФМС ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Фуфанон® 1,2 л/га

Вантекс® 0,06-0,07 л/га

Імпакт® К 0,6-0,8 л/га

Данадим® Мікс 1,0 л/га

Імпакт® 500 0,25 л/га

Імпакт® 500 0,25 л/га

Тремізія™ 0,4-0,5 л/га

Імпакт® Т 0,6-1,0 л/га

Еллай® Супер
15 г/га+ ПАР
Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га


Фаместра® 20-30 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га

Калібр® 40-50 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га

Пойнтер® 15-25 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га

Пікус®
0,3-0,85 л/т

Вінцит® Форте
1,25 л/т



Шукайте детальну інформацію на нашому сайті

www.fmc.com.ua

та завантажуйте електронний каталог FMC



**Повне портфоліо компанії
завжди під рукою**

*Завантажуйте та будьте
постійно на зв'язку з нами!*

