

НИКІТ®
ГЕРБІЦИД

FMC

Культура	Норми витрати препарату	Спектр дії	Спосіб та час обробок, період внесення	Кратність обробок
Кукурудза	0,16-0,2 л/га + ПАР Тренд® 90 0,25-0,3л/га	Однорічні та багаторічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування у фазі 4-10 листків кукурудзи	1 за сезон

Додавання ПАР Тренд® 90 у нормі -0,25-0,3л/га є необхідним для кращого змочування бур'янів (зокрема злакових видів), а також для підвищення ефективності дії гербіциду за умов недостатньої вологи. За посушливих умов, обприскування проводити у вечірні або нічні години із збільшенням концентрації ПАР Тренд® 90 до 0,15-0,2% (мінімум 0,3 л/га)

Чутливі види бур'янів

Злакові:

- Вівсюг (види)
- Райграс (види)
- Тонконіг (види)
- **Мишій (види)**
- **Пирій повзучий**
- **Куряче просо**
- Росичка (види)
- **Гумай (сорго алепське)**
- Свинорій пальчастий

Дводольні:

- Щириця загнута
- **Гірчиця польова**
- **Гірчаки (види)**
- Нетреба (види)
- Абутилон Теофраста
- **Зірочник середній**
- **Талабан польовий**
- Жабрій (види)




Нікіт[®] у технологіях захисту кукурудзи

Бакові суміші з Нікіт[®] :

Нікіт[®] 0,16-0,2 л/га + ПАР Тренд[®] 90 0,3 л/га + Хармоні[®] 10 г/га

Або

Нікіт[®] 0,16-0,2 л/га + ПАР Тренд[®] 90 0,3 л/га + (2,4 Д + флорасулам) 0,5 л/га



Нікіт[®] та Саксесор[™]


у технологіях захисту кукурудзи

Гербіцид Саксесор[™] необхідно застосовувати до сходів кукурудзи або після сходів в фазу 2-4 листки. Фаза розвитку бур'янів є ключовою для визначення часу застосування. Оптимальна ефективність найкраще досягається шляхом застосування до або під час сходів бур'янів.

Саксесор[™]
1,5-2 л/га


Нікіт[®] 0,16-0,2 л/га + ПАР Тренд[®] 90 0,3 л/га + Хармоні[®] 10 г/га

Саксесор[™]
1,5-2 л/га



Нікіт® - ефективність дії на гірчаки (шорсткий, почечуйний)

Агроплатформа LG – FMC, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н
Червень 2019. Обробка 15.05, фото 24.05



Нікіт® - ефективність дії та селективність у суміші

Агроплатформа LG – FMC, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н
Червень 2020. Обробка 20.05, фото 5.06



Контроль



Нікіт® 0,2 л/га + ПАР Тренд® 90 0,3 л/га



FMC ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ

Саксесор™
1,5-2,0 л/га

Брігейд™
3RIVE 3D®
0,6-1,2 л/га

Семафор®
2,0-2,5 л/т

Пікус 5,0-9,0 л/т

Вантекс 0,15 л/га

Данадим® Мікс 0,8-1,5 л/га

Нікіт® 0,16-0,2 л/га + ПАР Тренд® 0,25-0,3 л/га

Хармоні® 10 г/га +
ПАР Тренд® 0,25-0,3 л/га

Джалентра™ 0,2-0,3 л/га

Вантакор™ 0,035-0,05 л/га

Кораген® 0,12-0,15 л/га

Авант™ 0,2-0,25 л/га

00

09

10

11

12

14

15

16

17

34

53

63



Шукайте детальну інформацію на нашому сайті

www.fmc.com.ua

та завантажуйте електронний каталог FMC



**Повне портфоліо компанії
завжди під рукою**

*Завантажуйте та будьте
постійно на зв'язку з нами!*

