САКСЕССОР™ Т

Гербіцид

FMC An Agricultural Sciences Company

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРБІЦИДУ САКСЕССОР™ Т

Діючі речовини:	петоксамід – 300 г/л, тербутилазин – 187,5 г/л
Препаративна форма:	СЕ (суспо – емульсія)
Норма використання:	3,0–4,0 л/га
Хімічний клас:	хлорацетаміди, триазини
Паковання:	каністра 10 л; коробка 2 х 10 л
Термін зберігання:	2 роки

ПОДВІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДІЇ

Саксессор™ Т створено на основі двох діючих речовин, схвалених у ЄС: петоксаміду – інноваційної для України молекули з групи хлорацетамідів, та тербутилазину.

ПЕТОКСАМІД (HRAC/WSSA Група 15)

- Спрямований насамперед на контроль злакових бур'янів, а також контролює низку важливих видів дводольних.
- Належить до хімічного класу хлорацетамідів.
- Виступає інгібітором синтезу жирних кислот із дуже довгим ланцюгом (VLCFA). Речовина блокує процеси поділу та росту клітин у проростках.

ТЕРБУТИЛАЗИН (HRAC/WSSA Група 5)

- Спрямований насамперед на контроль широкого спектру дводольних бур'янів, доповнюючи захист проти частини однорічних злакових.
- Представник хімічного класу триазинів.
- Механізм полягає в інгібуванні фотосинтезу на рівні фотосистеми II (PS II) шляхом зв'язування з D1-білком.
- Це призводить до зупинки транспортного ланцюга електронів, накопичення активних форм кисню та подальшого руйнування клітинних мембран.

ПЕРЕВАГИ ГЕРБІЦИДУ САКСЕССОР™ Т

- **Інноваційна комбінація:** поєднання двох діючих речовин, схвалених у ЄС, із різними та взаємодоповнюючими механізмами дії.
- **Широкий спектр:** ефективний контроль широкого спектра однорічних злакових і дводольних бур'янів, включаючи проблемні види.
- **Тривала захисна дія:** ґрунтова активність забезпечує тривалий захист посівів та контроль бур'янів упродовж гербокритичного періоду.
- **Висока селективність:** м'яка дія на культури за дотримання регламенту застосування.

Застосування гербіциду **Саксессор™ Т** забезпечує надійний контроль чутливих бур'янів впродовж гербокритичного періоду, сприяючи збереженню густоти стояння культури та зменшенню конкуренції бур'янів із культурою за світло, вологу й поживні речовини.

Саксессор™ Т сприяє формуванню сприятливих умов для раннього розвитку соняшнику, кукурудзи й сої та реалізації їхнього потенціалу врожайності.

САКСЕССОР™ Т – СПЕКТР КОНТРОЛЬОВАНИХ БУР'ЯНІВ

ОДНОРІЧНІ ЗЛАКОВІ

Мишій, види
Плоскуха звичайна
Пальчатка, види
Жабрій, види
Зірочник середній
Канатник Теофраста
Кучерявець Софії
Лобода, види
Лутига, види
Нетреба звичайна
Осот жовтий городній
Падиця ріпаку
Паслін чорний
Підмаренник чіпкий
Ромашка, види
Роман польовий
Талабан польовий
Щириця, види
Чорнощир, види

ОДНОРІЧНІ ДВОДОЛЬНІ

Амброзія полинолиста
Вероніка, види
Галінсога дрібноквіткова
Герань, види
Гібіск трійчастий
Гірчиця польова
Грицики звичайні
Гірчак, види
Дурман звичайний

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ САКСЕССОР™ Т

Культура	Норма витрати, л/га	Спектр дії	Спосіб та строки застосування	Кратність обробок
Соняшник, кукурудза	3,0 – 4,0	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування після посіву до появи сходів культури	1
Соя*				

* розширення реєстрації очікується у 2027 році

Будь ласка застосовуйте продукти відповідально та безпечно.
Дотримуйтесь рекомендацій виробника, що вказані на етикетці.


ag.fmc.com/ua/uk

САКСЕССОР™ Т

Гербіцид


FMC An Agricultural Sciences Company

САКСЕССОР™ Т У ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ



- **Саксессор™ Т** – гнучкий компонент комплексних програм гербіцидного захисту соняшнику.
- Препарат може застосовуватися як самостійно, так і в бакових та послідовних програмах із гербіцидами залежно від спектра та рівня забур'яненості, ґрунтово-кліматичних умов і технології вирощування.
- **Саксессор™ Т** може бути інтегрований у системи захисту гібридів соняшнику **ExpressSun™**, **HTS** та інших гібридів, адаптованих до гербіцидів **Express®**, **Express® Gold**, як компонент комплексної програми до- та післясходового контролю бур'янів.

САКСЕССОР™ Т У ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ



- Основне вікно застосування **Саксессор™ Т** на кукурудзі – досходове: обприскування після посіву до появи сходів культури.
- За потреби, можливе раннє післясходове внесення (у фазу 2–4 листків кукурудзи).
- За умов післясходового застосування найкращий ефект досягається проти однорічних злакових бур'янів на стадії проростання – перший листок, а проти дводольних – на стадії сім'ядолей.
- В ситуації коли бур'яни переросли, гербіцид використовується в бакових сумішах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ САКСЕССОР™ Т

- **Саксессор™ Т** розроблений для ефективного контролю комплексного забур'янення. Препарат забезпечує надійну дію проти широкого спектра однорічних злакових та дводольних бур'янів, в т.ч. проблемних.
- Ключовими умовами для прояву максимальної ефективності **Саксессор™ Т** є якісна передпосівна обробка (дрібногрудкувата структура ґрунту без рослинних решток), наявність вологи в верхньому шарі ґрунту або випадання опадів після внесення, дотримання норми використання (на легких ґрунтах – мінімальної) та якісне внесення препарату.
- **Саксессор™ Т** не потребує загортання в ґрунт у регіонах чи за умов достатнього зволоження. Однак за умов тривалої повітряної та ґрунтової посухи поверхневе загортання препарату підвищує стабільність його гербіцидної дії.
- Рекомендована норма виливу робочого розчину 200-350 л/га. Для внесення рекомендується використовувати двоплощинні форсунки (наприклад, IDTA або IDKT) з розміром крапель близько 450–600 мкм, що забезпечують рівномірне покриття поверхні ґрунту та мінімізують знесення.

УВАГА: варто розуміти, що польова біологічна ефективність використання ґрунтових гербіцидів є результатом суми чи комбінації низки факторів, як-от: норми витрати препарату та об'єму робочого розчину, pH і вмісту гумусу в ґрунті, його вологості й структури (грудкуватості), якості внесення (зокрема використання спеціальних форсунок для ґрунтових гербіцидів), погодних умов до, під час та після обробки, а також рівня забур'яненості поля.

Будь ласка застосовуйте продукти відповідально та безпечно.
Дотримуйтесь рекомендацій виробника, що вказані на етикетці.

ag.fmc.com/ua/uk