



ҐРУНТОВИЙ ГЕРБИЦИД САКСЕССОР™ Т

Опис препарату САКСЕССОР™ Т



Діюча речовина:

петоксамід – 300 г/л+ тербутилазин 187,5 г/л

Препаративна форма:

концентрат суспензії

Норма використання:

3,0-4,0 л/га

Хімічний клас:

Хлорацетаміди, триазини

Пакування каністра:

5 та 10л

Клас токсичності:


2

Термін зберігання:

2 роки

Регламенти застосування САКСЕССОР™ T

Культура	Норма витрати препарату	Спектр дії	Спосіб та строки застосування	Кратність обробок
Кукурудза на зерно	3,0-4,0 л/га	Одно- та дводольні бур'яни	1) ґрунтово- після посіву до появи сходів кукурудзи 2) ранньопіслясходово в фазі 2- 4 листки кукурудзи включно	1
Соняшник	3,0-4,0 л/га	Одно- та дводольні бур'яни	ґрунтово- після посіву до появи сходів	1



- Ґрунтовий гербіцид Сакссесор™ Т містить петоксамід- абсолютно нову на ринку України діючу речовину групи хлорацетамідів від компанії FMC.
- Також містить тербутилазин, який належить до хімічної родини триазинів. Він має системну активність Він переміщується через ксилему до сайтів дії. Він порушує функцію синтезу хлорофілу, пригнічуючи перенос електронів на фотосистемному рецепторі II у реакції Гілла. Група HRAC: C1.
- Після поглинання діючої речовини через коріння, гіпокотиль і сім'ядолі він пригнічує біосинтез ліпідів у бур'янах.

Саксесор™ Т Ефективно контролює наступні види:

- *Amaranthus* spp. (види щириці), *Brassica napus* (ріпак, падалиця), *Capsella bursa-pastoris* (грицики звичайні), *Chenopodium album* (лобода біла), *Myosotis arvensis*, *Polygonum aviculare* (спориш), *Sinapis arvensis* (гірчиця польова), *Solanum nigrum* (паслін чорний), *Galinsoga parviflora* Галінсога дрібноквіткова), *Matricaria* spp. (види ромашки), *Mercurialis annua*

та злакові бур'яни, такі як

- *Echinochloa crus-galli* (куряче просо), *Setaria* spp. (види мишію), *Digitaria sanguinalis* (пальчатка) і *Poa annua* (тонконіг)



Amaranthus spp.



Brassica napus



Capsella bursa-pastoris



Chenopodium album



Polygonum aviculare



Sinapis arvensis



Solanum nigrum



Galinsoga parviflora



Matricaria spp.



Echinochloa crus-galli



Setaria spp.



Digitaria sanguinalis




Poa annua

Система захисту соняшнику Експрес™

Саксесор™ Т
3,0-4,0 л/га

Експрес™ 75 ВГ 40-
50 г/га + ПАР
Тренд® 90 0,25-
0,3 л/га



Саксесор™

FMC | An Agricultural Sciences Company


у технологіях захисту кукурудзи

Саксесор™ Т 3,0-4,0 л/га

Гербіцид Саксесор™ Т необхідно застосовувати до сходів кукурудзи або після сходів в фазу 2-4 листки. Фаза розвитку бур'янів є ключовою для визначення часу застосування. Оптимальна ефективність найкраще досягається шляхом застосування до або під час сходів бур'янів.

Нікіт® 0,16-0,2 л/га + ПАР Тренд® 90 0,3 л/га + Хармоні® 10 г/га

Саксесор™ Т
3,0-4,0 л/га



Ефективність Саксесор™ Т



Ефективність Саксесор™ Т



Шукайте детальну інформацію на нашому сайті
www.fmc.com.ua

та завантажуйте електронний каталог FMC



**Повне портфоліо компанії
завжди під рукою**
*Завантажуйте та будьте
постійно на зв'язку з нами!*

