

Фаместра™

Гербіцид

ДІЯ НА ЛОБОДУ БІЛУ

Фаместра™ 30 г/га
+ Тренд® 90 0,3 л/га

Київська обл.,
Броварський р-н,
обробка 25.09.2020.





10 днів після обробки

ДІЯ НА ПАДАЛИЦЮ РІПАКУ

Фаместра™ 30 г/га
+ Тренд® 90 0,3 л/га

1. Кіровоградська обл.,
Фото 17.05.2019
Обробка 07.05.2019

2. Одеська обл.,
Фото 10.11.2020.
Обробка 28.10.2020



10 днів після обробки



12 днів після обробки

ДІЯ НА ТАЛАБАН ПОЛЬОВИЙ

ДІЯ НА КУЧЕРЯВЕЦЬ СОФІЇ

Фаместра™ 30 г/га + Тренд® 90 0,3 л/га



10 днів після обробки

Кіровоградська обл.,
фото 17.05.2019



10 днів після обробки

Кіровоградська обл.,
фото 17.05.2019



12 днів після обробки

Одеська обл., листопад 2020



За консультаціями та з питань придбання звертайтесь до регіональних керівників та представників компанії FMC

Керівник регіону Захід

Андрій Кучерявий
(066) 797 45 43

Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Одеська області

Керівник регіону Захід

Олексій Дворський
(050) 324 00 03

Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Луганська, Харківська області

Регіональні представники

Асауленко Володимир	Вінницька область	(066) 591 27 50
Паламарчук Костянтин	Вінницька область	(066) 380 90 31
Бай Ярослав	Волинська, Рівненська області	(066) 721 41 25
Рябка В'ячеслав	Дніпропетровська, Донецька області	(095) 284 95 03
Кіндер Олександр	Житомирська область	(050) 634 41 06
Ільницький Олександр	Закарпатська, Львівська області	(095) 800 10 34
Плаксін Віталій	Запорізька область	(050) 312 01 96
Кучма Олександр	Івано-Франківська, Тернопільська області	(050) 398 30 99
Продиус Микола	Київська область	(050) 411 32 91
Курцев Володимир	Кіровоградська область	(050) 419 29 63
Яровий Володимир	Луганська , Харківська області	(095) 284 95 01
Стефанко Ігор	Миколаївська область	(095) 800 10 54
Мотрук Сергій	Одеська область	(095) 284 95 09
Клименко Євген	Полтавська область	(050) 355 90 02
Заковоротний Олександр	Сумська область	(050) 471 44 32
Шапаренко Микола	Харківська область	(050) 275 14 55
Білоклин Віктор	Хмельницька та Чернівецька області	(050) 293 04 42
Гвоздь Олександр	Черкаська область	(050) 982 04 28
Здор Сергій	Чернігівська область	(050) 435 82 86

Центральний офіс

Балас Вікторія	Менеджер з розвитку проєктів	(050) 492 24 20
Салієнко Володимир	Продакт-менеджер інсектицидного портфеля	(050) 410 19 18
Ткачук Руслан	Продакт-менеджер фунгіцидного та гербіцидного портфеля	(075) 418 25 87
Рубанка Тарас	Менеджер із розвитку продуктів для спеціальних культур	(050) 356 99 76
Дмитро Стратієвський	Менеджер по роботі з ключовими клієнтами	(050) 353 54 85

WWW.FACEBOOK.COM/FMCUA

ag.fmc.com/ua/uk



Фаместра™

Гербіцид

Високоефективний післясходовий гербіцид системної дії для контролю дводольних бур'янів (зокрема підмаренника чіпкого, осотів та інших видів), а також падалиці ріпаку класичної технології і падалиці соняшнику, включно з гібридами гербіцидостійких технологій.

БУДЬ ЛАСКА ЗАСТОСОВУЙТЕ ПРОДУКТИ ВІДПОВІДАЛЬНО ТА БЕЗПЕЧНО.
ДОТРИМУЙТЕСЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ВИРОБНИКА, ЩО ВКАЗАНІ НА ЕТИКЕТЦІ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРБІЦИДУ ФАМЕСТРА™

Високоефективний післясходовий гербіцид системної дії для контролю дводольних бур'янів (зокрема підмаренника чіпкого, осотів та інших видів), а також падалиці ріпаку класичної технології і падалиці соняшнику, включно з гібридами гербіцидостійких технологій.

Діюча речовина	Трибенурон-метил 600 г/кг + флорасулам 200 г/кг
Хімічний клас	Сульфонілсечовини + Триазолпіримідини
Препаративна група	Водорозчинні гранули
Розподіл у рослині	Системний
Упаковка	Пластикова банка 250 г
Гарантійний термін зберігання	3 роки

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Норми витрати препарату	Спектр дії	Спосіб та строки застосування	Кратність обробок
Пшениця, ячмінь	20-25 г/га + ПАР Тренд® 90 0,25-0,3 л/га	Однорічні та багаторічні дводольні (у фазі 2-6 листків)	Обприскування посівів від фази 2-3 листків до прапорцевого листка культури	1 за сезон
	25-30 г/га + ПАР Тренд 90 0,25-0,3 л/га	Однорічні та багаторічні дводольні (у фазі розетки)+підмаренник чіпкий (до 4-х кілець)		

Норма витрати робочої рідини – 200-300 л/га

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Для досягнення максимальної ефективності гербіцид **Фаместра™** варто застосовувати в період активної вегетації бур'янів та падалиці соняшнику та ріпаку на їхніх ранніх фазах розвитку й за температури від +8 °С до +25 °С.
- Не застосовувати гербіцид за наявності на листках роси, щоб запобігти стіканню робочого розчину з їхньої поверхні.
- Обприскування посівів варто робити у безвітряну погоду, ранкові або вечірні години, забезпечуючи рівномірне покриття листкової поверхні бур'янів.
- Обов'язково потрібно додавати ПАР **Тренд® 90** у нормі 0,25-0,3 л/га та дотримуватися рекомендованих норм витрати препарату **Фаместра™** і робочої рідини (200-300 л/га).

Фаместра™
Гербіцид

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- Ефективний контроль падалиці соняшнику (в т. ч. стійкої до імідазолінів та **Експрес® 75 в.г.**), падалиці традиційного ріпаку, підмаренника чіпкого, осотів та інших видів бур'янів.
- Висока біологічна ефективність проти бур'янів, стійких до 2,4-Д і МЦПА.
- Дощостійкість уже через 2 години після внесення.
- Висока селективність до культурних рослин.
- Широке технологічне вікно у строках застосування.
- Можливість застосування у широкому діапазоні температур повітря і вологості.
- Відсутність будь-яких обмежень у сівозміні для наступних культур.
- Низька норма витрати та висока економічна ефективність.

СЕЛЕКТИВНІСТЬ ТА ГНУЧКІСТЬ

Селективний до пшениці та ячменю від фази 2-3 листків до прапорцевого листка

Ефективний від +8 °С середньодобової температури



ЗОСЕРЕДЖЕНИЙ НА ЧИСТОТІ ПОСІВІВ!

Трибенурон-метил	+	Флорасулам	=	**Фаместра™**
Осот, види Кульбаба лікарська Щавель, види Лобода біла Ромашка, види Мак, види Капустяні види бур'янів		Падалиця соняшнику, у т.ч. технології Експрес™ та Clearfield Підмаренник чіпкий Амброзія полинолиста Ромашка, види Мак дикий Волошка синя Гірчак, види Капустяні види бур'янів		Падалиця соняшнику, у т.ч. технології Експрес™ та Clearfield Осот, види Підмаренник чіпкий Лобода біла Ромашка, види Мак дикий Кульбаба лікарська Щавель, види Волошка синя Гірчак, види Капустяні види бур'янів

Фаместра™
Гербіцид

ДІЯ НА ПАДАЛИЦЮ СОНЯШНИКУ, СТІЙКОЇ ДО ЕКСПРЕС®

Фаместра™ 30 г/га + Тренд® 90 0,3 л/га

Київська обл., Фастівський р-н, травень 2019



10 днів після обробки

ДІЯ НА ПАДАЛИЦЮ СОНЯШНИКУ ТЕХНОЛОГІЇ CLEARFIELD

Фаместра™ 30 г/га + Тренд® 90 0,3 л/га

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обробка 17.05. 2019



23.05.2019 | 23.05.2019 | 01.06.2019

ДІЯ НА ПІДМАРЕННИК ЧІПКИЙ

Фаместра™ 30 г/га + Тренд® 90 0,3 л/га

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обробка 17.05. 2019



23.05.2019 | 23.05.2019 | 01.06.2019

ДІЯ НА ОСОТ ПОЛЬОВИЙ

Фаместра™ 30 г/га + Тренд® 90 0,3 л/га

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, Обробка 17.05. 2019



23.05.2019 | 23.05.2019 | 01.06.2019