
FMC
An Agricultural Sciences Company
Коли у бур'янів
"зв'язані руки"
Фаместра®
Гербіцид
Комбінований післясходовий гербіцид для ефективного контролю широкого спектру двосім'ядольних бур'янів, зокрема всіх видів падалиці соняшнику та традиційної падалиці ріпаку, підмаренника чіпкого, видів осотів

ФАМЕСТРА™: ОПИС ПРЕПАРАТУ

Діючі речовини:

Трибенурон-метил 600 г/кг, флорасулам 200 г/кг

Норма використання: 20 - 30 г/га

Препаративна форма: Водорозчинні гранули (в.г.)

Реєстрація:

Пшениця

Ячмінь

Упаковка: Пластмасова банка 250 г

ФАМЕСТРА™: РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Норми витрати препарату	Спектр дії	Спосіб та строки застосування	Кратність обробок
Пшениця, ячмінь	20 - 25 г/га + ПАР Тренд® 90 0,25-0,3 л/га	Однорічні дводольні (у фазі 2-6 листків)	Обприскування культури від фази 2-3 листків до прапорцевого листка.	1 за сезон
	25 - 30 г/га + ПАР Тренд® 90 0,25-0,3 л/га	Однорічні та багаторічні дводольні (у фазі розетки) + підмаренник чіпкий + падалиця ріпаку та соняшнику		

Падалиця соняшнику: оптимальні стадії - сім'ядолі - 2 листка, норма 25-30 г/га + Тренд® 90 0,3 л/га;
Падалиця ріпаку: оптимальні стадії - сім'ядолі - 4 листка, норма 30 г/га + Тренд® 90 0,3 л/га, краще контролювати з осені.

Норма витрати робочого розчину - 200-300 л/га

ФАМЕСТРА™: МЕХАНІЗМ ДІЇ

- **Фаместра™** складається із двох діючих речовин, що належать до групи **АЛС інгібіторів**:
  - **Флорасуламу:** хімічний клас триазолпіримідини, група 2 за HRAC;
  - **Трибенурон-метил:** хімічний клас сульфонілсечовини, група 2 за HRAC;
- Проникаючи в бур'ян, діючі речовини **Фаместра®** легко поглинаються та переносяться як по ксилемі, так і по флоемі до місць дії в точках росту.
  - Вони пригнічують ацетолактатсинтазу - ключовий фермент в синтезі амінокислот з розгалуженим ланцюгом - ізолейцину, лейцину та валіну.
  - Клітини бур'янів у точках росту втрачають можливість до поділу, внаслідок чого припиняється ріст бур'янів і вони не створюють конкуренцію культурним рослинам.
- Видимі симптоми з'являються через 3-7 днів після внесення гербіциду, а повна загибель чутливих видів бур'янів настає через 2-4 тижні.

ФАМЕСТРА™: ПЕРЕВАГИ

- **Краще рішення для контролю падалиці:**
  - **соняшнику виробничих технології Clearfield / Clearfield Plus та стійкого до Експрес™ 75 ВГ**
  - **ріпаку класичної технології**
- **Проти осотове рішення для сівозміни.**
- **Контроль широкого спектру дводольних бур'янів, в т.ч. підмареннику чіпкого, та бур'янів, стійких до 2,4Д та МЦПА.**
- **Пригнічення розвитку проблемних (середньо-чутливих) бур'янів: фіалки польової, сокирок польових, рутки лікарської.**

- Висока селективність до культурних рослин.
- Широке технологічне вікно у строках застосування.
- Можливість застосування у широкому діапазоні температур повітря і вологості.
- Застосування у всіх типах сівозмін без обмежень.
- Низька норма витрати препарату на гектар, висока сумісність, технологічність.
- Низька норма витрати та висока економічна ефективність.

ФАМЕСТРА™: СПЕКТР ДІЇ

FMC An Agricultural Sciences Company

Зосереджений на чистоті посівів!

Трибенурон -метил	+	Флорасулам	=	Фаместра™
Осот, види		Падалиця соняшнику, у т.ч. Express, Clearfield		Падалиця соняшнику, у т.ч. Express, Clearfield
Кульбаба лікарська		Підмаренник чіпкий		Осот, види
Щавель, види		Лобода біла		Підмаренник чіпкий
Лобода біла		Волошка, види		Лобода біла
Волошка, види		Фіалка, види		Ромашка, види
Фіалка, види		Ромашка, види		Мак, види
Ромашка, види		Мак, види		Кульбаба лікарська
Мак, види				Щавель, види
				Волошка, види
				Фіалка, види

ФАМЕСТРА™: СПЕКТР ДІЇ


Амброзія (види)	Кропива жалка	Роговик польовий
Вика яра	Кислиця види	Ромашка (види)
Болиголов плямистий	Конюшина перевернута	Роман польовий
Волошка синя	Кукіль звичайний	Рижій дикий
Галінсога дрібноквіткова	Куколиця біла	Смілка звичайна
Гірчак берізковидний	Кульбаба лікарська	Соняшник (падалиця)
Гірчак почечуйний	Кучерявець Софії	Суріпиця звичайна
Гірчак шорсткий	Кохія вінична	Сухоребрик лікарський
Гірчиця польова	Латук (молокан) татарський	Сухоребрик Льозеліїв
Гірчиця чорна	Льонок звичайний	Талабан польовий
Герань м'яка	Лобода біла	Хориспора ніжна
Герань розсічена	Лутига розлога	Хризантема посівна
Глуха кропива пурпурова	Мак самосійка (дикий)	Хрінниця крупковидна
Грабельки звичайні	Нетреба звичайна	Чина (види)
Грицики звичайні	Осот городній (жовтий)	Щавель, види
Дурман звичайний	Осот польовий (рожевий)	Щириця звичайна
Дворядник (види)	Паслін чорний	Щириця гібридна
Жабрій звичайний	Підмареник чіпкий	Шпергель польовий
Жовтозілля звичайне	Переліска однорічна	Яснотка пурпурова
Жовтець (види)	Полин однорічний	Рутка лікарська
Зірочник середній	Полин звичайний	Жовтушник (види)
Злинка канадська	Празелень звичайна	Мак білий
Канатник Теофраста	Ріпак (падалиця)	Сокирки польові
Капуста польова (дика)	Редька дика	Фіалка (види)

Чутливі та високочутливі

Малочутливі та середньочутливі

Порівняння спектру дії Фаместра™ та Калібр®

FMC An Agricultural Sciences Company




ФАМЕСТРА™: СЕЛЕКТИВНІСТЬ ТА ГНУЧКІСТЬ

FMC An Agricultural Sciences Company

Селективний до пшениці та ячменю від стадії початку кущіння до появи прапорцевого листка

Фаместра™

Ефективний від +8˚ С середньодобової температури



ФАМЕСТРА™: ДІЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ



Контроль (без обробки)
Кіровоградська обл., травень 2019.

ФАМЕСТРА™: ДІЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

FMC An Agricultural Sciences Company





Дія Фаместра™ (25г/га) на підмареник чіпкий. 30 днів після обробки.
Кіровоградська обл., травень 2019.

ФАМЕСТРА™: ДІЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ



Дія Фаместра™
25г/га + Тренд ® 90 0,3 л/га
на підмареник чіпкий.

5 днів після обробки.

Львівська обл., травень 2021.

ФАМЕСТРА™: ДІЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

FMC An Agricultural Sciences Company



Дія Фаместра™ 25г/га + Тренд ® 90 0,3 л/га на мак дикий.

5 днів після обробки.

Львівська обл., травень 2021.

ФАМЕСТРА™: ДІЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

FMC An Agricultural Sciences Company







Дія на падалицю соняшнику стійку до трибенурон-метилу.

10 днів після обробки

**Київська обл.,
Фастівський р-н,
травень 2019.**

ФАМЕСТРА™: ДІЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

FMC An Agricultural Sciences Company

Контроль



23.05.2018

Фаместра® 30 г/га + Тренд 0,3 л/га



23.05.2018



01.06.2018

FMC

THE NATURE OF NEX

FMC

Дія на падалицю соняшнику технології Clearfield.
Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, обробка 17.05.

ФАМЕСТРА™: ДІЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

FMC An Agricultural Sciences Company

Контроль



23.05.2018

Фаместра® 30г/га + ПАР Тренд® 900,3 л/га



23.05.2018



01.06.2018

THE NATURE OF NEXT

FMC

Дія на підмаренник чіпкий.
Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, обробка 17.05.2019

ФАМЕСТРА™: ДІЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

FMC An Agricultural Sciences Company

Контроль



23.05.2018

Фаместра® 30г/га + ПАР Тренд® 90 0,3 л/га



23.05.2018



01.06.2018

Дія на осот польовий.

ФАМЕСТРА™: ДІЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

FMC An Agricultural Sciences Company

Дія на лободу білу.
Київська обл.,
Броварський р-н,
фото 4.10.2020.
обробка 25.09.2020





ФАМЕСТРА™: ДІЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

FMC An Agricultural Sciences Company

Дія на берізку польову
Київська обл., Броварський р-н,
обробка 25.09.2020
фото 4.10.2020







ФАМЕСТРА™: ДІЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ



Дія на талабан польовий. 10 днів після обробки
Кіровоградська обл., 2019.

ФАМЕСТРА™: ДІЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ



Дія на кучерявець Софії. 10 днів після обробки
Кіровоградська обл., 2019.



Одеська обл.,12 днів після обробки, листопад 2020

ФАМЕСТРА™: ДІЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ



Дія на падалицю ріпаку.
10 днів після обробки
Кіровоградська обл., 2019.



Дія на падалицю ріпаку.
12 днів після обробки
Одеська обл., 10.11.2020.
Обробка 28.10.2020

ФАМЕСТРА™: ДІЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

FMC An Agricultural Sciences Company





Дія на падалицю ріпаку.
20 днів після обробки
Київська обл., 2024.

ДОДАТКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Найкраща дія препарату **Фаместра™** досягається при обробці дводольних бур'янів на ранніх стадіях їх розвитку: однорічних у фазах 2–6 листків, багаторічних — у фазах розетки до початку стеблування, падалиці соняшнику — сім'ядолі - 2 листка, падалиці ріпаку — сім'ядолі - 4 листка.

Мінімальна норма препарату (20-25 г/га) застосовується, якщо в посіві переважають однорічні дводольні бур'яни у стадії 2-6 листків. Якщо ж обробка направлена проти переростих чи багаторічних бур'янів то варто використовувати максимальні норми **Фаместра™** (25-30 г/га) та бажано використовувати максимальні норми витрати робочого розчину (300 л/га) для кращого покриття цільових обєктів.

Не рекомендується вносити гербіцид **Фаместра®** як компонент багатокомпонентних бакових сумішей (3 і більше різних продуктів), а також не рекомендується вносити в сумішах з фосфорорганічними інсектицидами (інтервал повинен становити 7-14 днів).

Уникати вносити за високих (вище 25°С) і низьких (нижче 8 °С) температур та коли рослини знаходяться в стресі.

Обовязково використовувати з **ПАР Тренд® 90**, у нормі 0,3 л/га (0,15%).

Опади, що пройшли через 2 години після застосування, не знижують ефективність препарату.

ПАР Тренд®90

Поверхнево-активна речовина неіонного типу для підсилення дії гербіцидів FMC.



Рекомендації

- Використовуйте оригінал.
- Норма використання: 0,25-0,3 л/га.
- Концентрація: 0,125-0,15%.
- Важливо для контролю:
  - амброзії, підмаренника чіпкого
  - осот, види
  - лободи, гірчаків, пасльону
  - падалиці ріпаку та капустяних видів бур’янів
  - в посушливих умовах, переростання бур’янів

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

FMC An Agricultural Sciences Company

Фуфанон®
1,2 л/га

Вантекс®
0,06 - 0,07 л/га

Данадим® Мікс 1,0 л/га

Імпакт® Т 0,6 – 1,0 л/га

Імпакт® К 0,6 - 0,8 л/га

Тремізія™
0,4 - 0,5 л/га

Імпакт® Т
0,6 - 1,0 л/га


Еллай® Супер
15 г/га+ ПАР
Тренд™ 90

Фамістра® 20 - 30 г/га
+ ПАР Тренд™ 90 0,25 - 0,3 л/га

Пойнтер® 15 - 25 г/га
+ ПАР Тренд™ 90 0,25 - 0,3 л/га

Пікус®
0,3-0,85 л/т

Вінцит® Форте
1,25 л/т



ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ЯЧМЕНЮ

FMC An Agricultural Sciences Company

Імпакт®500 0,25 л/га

Фаместра® 20-30 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га

Пойнтер® 15-25 г/га
+ ПАР Тренд® 90 0,25 - 0,3 л/га

Пікус
0,3-0,85 л/т

Вінцит® Форте
1,25 л/т





FMC An Agricultural Sciences Company

Шукайте детальну інформацію на нашому сайті

ag.fmc.com/ua/uk

та завантажуйте електронний каталог FMC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Повне портфоліо компанії завжди під рукою

Завантажуйте та будьте постійно на зв'язку з нами!

