



Zalo: FMC Việt Nam



Facebook: FMC Việt Nam



CÔNG TY TNHH FMC VIỆT NAM

Văn phòng đại diện: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3 868 9636 - Hotline tư vấn: 1900 88 66 47

Nhà máy: Số 12, Lô B, Đường Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3 790 503 - Fax: (0274) 3 790 501

www.fmc.com FMC Việt Nam FMC Việt Nam



DIỆT SẠCH NẤM BỆNH TRÊN NHIỀU LOẠI CÂY TRỒNG

BẢO VỆ TỐI ĐA NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG
VỚI HOẠT CHẤT TIÊN TIẾN

THÔNG TIN TƯ VẤN
☎ 1900 88 66 47



TỔNG QUÁT GIẢI PHÁP:

Flint Pro® 648WG đặc trị đạo ôn lúa, thán thư, mốc xám và đốm lá trên nhiều loại cây trồng. **Flint Pro®** được phối hợp bởi 2 hoạt chất tiên tiến Trifloxystrobin và Propineb nên có tác dụng vừa phòng, vừa trị bệnh.

ĐẶC TÍNH:

- Đặc trị Đạo ôn lúa, Thán thư, Đốm lá trên nhiều loại cây trồng
- Phòng trừ bệnh triệt để, hiệu lực kéo dài
- Tiện lợi, hiệu quả kinh tế cao

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng	Cách sử dụng
Lúa	Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông	1 kg/ ha	Pha 62,5 g/ bình 25 lít, phun 1,6 bình/ 1000 m ²
Dưa chuột (dưa leo), ớt, dưa hấu	Thán thư	1,25 kg/ ha	Pha 62,5 g/ bình 25 lít, phun 2 bình/ 1000 m ²
Bắp cải, cà chua	Đốm lá		
Rau cải	Mốc xám		
Xoài	Thán thư	0,2 %	Pha 400 g/ phuy 200 lít, phun ướt đều tán cây
Nhãn	Thán thư	0,14 %	Pha 280 g/ phuy 200 lít, phun ướt đều cây trồng

LƯU Ý:

Thời điểm sử dụng: phun khi bệnh vừa xuất hiện; lúa, rau cải: phun khi tỷ lệ bệnh 5-10 %.

Thời gian cách ly: ngừng sử dụng thuốc trước thu hoạch 5 ngày đối với ớt, xoài, bắp cải; 7 ngày đối với lúa, dưa leo, dưa hấu, cà chua, rau cải, nhãn.

QUY TRÌNH QUẢN LÝ BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN LÚA:



QUY TRÌNH QUẢN LÝ BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN LÚA

BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN

Nguyên nhân: do nấm *Pyricularia oryzae* gây ra

01

- VỆ SINH ĐỒNG RỪNG
- SỬ DỤNG GIỐNG KHÁNG
- XỬ LÝ HẠT GIỐNG TRƯỚC KHI SẠ
- GIEO SẠ MẬT ĐỘ VỪA PHẢI
- HẠN CHẾ BÓN THỪA PHÂN ĐẠM
- PHÒNG BỆNH KHI THỜI TIẾT BẤT LỢI

02

LƯU Ý KHI LÚA ĐANG NIÊM BỆNH:

- KHÔNG ĐỂ RỪNG KHÔ NƯỚC
- HẠN CHẾ SỬ DỤNG PHÂN ĐẠM
- ÁP DỤNG THUỐC ĐẶC TRỊ

Thời điểm gieo: 0,13 g/kg
Thời điểm sạ: 0,13 g/kg
Thời điểm gieo: 0,13 g/kg

Vết bệnh mới nhiễm
Vết bệnh điển hình
Vết bệnh đang phát triển

ĐẠO ÔN là một trong những loại bệnh hại nguy hiểm trên Lúa gây thất thu lên đến 60% nếu không phòng trị kịp thời.

HẬU QUẢ CỦA BỆNH ĐẠO ÔN

- THỜI ĐIỂM GÂY HẠI:** Từ giai đoạn nảy mầm đến khi gần thu hoạch
- VỊ TRÍ BỆNH GÂY HẠI:** Trên tất cả các bộ phận: đốt thân, lá, cổ bông...
- ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠT LÚA:** Trên vỏ hạt bệnh gây nên hội chứng lem lép hạt.

XỬ LÝ FLINT PRO® 648WG:

SẠCH BỆNH ĐẠO ÔN - CỨNG CÂY ĐỨNG LÁ

Phòng trừ Đạo ôn lá: khi bệnh chớm xuất hiện (châm kim)
Phong trừ Đạo ôn cổ bông:
Lần 1: lúc lúa chuẩn bị trổ.
Lần 2: lúc lúa trổ đều.