FMC | An Agricultural Sciences Company

Zalo: FMC Việt Nam

Facebook: FMC Việt Nam

CÔNG TY TNHH FMC VIỆT NAM

Văn phòng đại diện: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: **(028) 3 868 9636** - Hotline tư vấn: **1900 88 66 47**

Nhà máy : Số 12, lô B, Đường Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: **(0274) 3 790 503** - Fax: **(0274) 3 790 501**

www.fmc.com FMC Việt Nam FMC Việt Nam

FMC | An Agricultural Sciences Company

Marshal® 200SC

THUỐC TRỪ SÂU

TẠM BIỆT SÂU - RẦY
NHÀ NÔNG THẮNG LỚN

Marshal® 200SC

ĐẶC TRỊ **RỆP SÁP**

HẠI CÂY TRỒNG

THÔNG TIN TƯ VẤN:

1900 88 66 47

FMC | An Agricultural Sciences Company

THÔNG TIN TỔNG QUAN:

- Hoạt chất: **Carbosulfan**
- Công dụng: Phòng trị rầy nâu, sâu đục thân hại lúa, rệp sáp, ve sầu hại cà phê thông qua tác dụng phổ rộng và thấm sâu, lưu dẫn

ĐẶC TÍNH:

- Thấm sâu và chuyển vị nhanh trong cây
- Tác động đến sâu hại bằng 3 con đường: tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn
- Đặc trị côn trùng chích hút và sâu hại ẩn khuất bên trong cây trồng

LỢI ÍCH:

- Nhanh chóng hạ gục sâu hại
- Diệt triệt để các lứa tuổi kể cả trứng
- Bảo vệ cây trồng tối đa
- Không sợ bị rửa trôi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng	Dịch hại	Liều lượng	Cách dùng
Lúa	Rầy nâu	0.8 - 1.0 lít/ha	Lượng nước phun 400-600 lít/ha
	Sâu đục thân	1.0 lít/ha	
Cà phê	Rệp sáp	1.2 - 1.4 lít/ha	
	Ve sầu	0.3%	Xử lý thuốc khi ấu trùng ve sầu xuất hiện & gây hại

**Lượng thuốc: 50ml thuốc/25 lít nước; 500ml thuốc/ Phi 200 lít*

FMC | An Agricultural Sciences Company

QUY TRÌNH QUẢN LÝ SÂU BỆNH TRÊN LÚA:

Marshal® 200SC giải pháp phòng trừ rầy nâu, sâu đục thân hại lúa.



Bệnh hại	Flint Pro® 648WG Đạo ôn	Flint Pro® 648WG Đạo ôn	Rovral® 50WP Lem lép hạt
Sâu hại	Prevathon® 0.4GR - Sâu cuốn lá - Sâu đục thân	Marshal® 200SC - Rầy nâu - Sâu đục thân	Prevathon® 5SC - Sâu cuốn lá - Sâu đục thân

QUY TRÌNH QUẢN LÝ SÂU BỆNH TRÊN CÀ PHÊ:

	- Rỉ sắt tấn công gây rụng lá, nở hoa xanh. - Rệp sáp xuất hiện hút nhựa cây gây khô chùm quả, khô cành.	- Rỉ sắt, nấm hồng, đốm lá tấn công - Tuyến trùng hại hệ thống rễ gây vàng lá - Cây hấp thụ phân bón kém gây ra hiện tượng rụng quả sinh lý. - Rệp sáp tiếp tục gây hại, chích hút làm khô chùm bông. Nông dân có tập quán phun thuốc trừ rệp sáp sau khi có cơn mưa đầu mùa.	- Mưa nhiều, áp lực bệnh thán thư, rỉ sắt, nấm hồng. - Thán thư gây thối cuống quả & rụng quả. - Cành dự trữ phát triển kém.	- Chất lượng nhân kém do nám quả, thối nhân. - Tuyến trùng gây ra thối rễ.

12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Chăm sóc sau thu hoạch	Ra hoa, đậu quả		Giai đoạn phát triển trái						Giai đoạn vào chắc		

*Sử dụng kết hợp **Marshal® 200SC (500ml)** và **Rovral® 50WP (250g)** trong giai đoạn này để kiểm soát sâu - bệnh tốt hơn cho cà phê (phi 200 lít)*