

## Hướng dẫn sử dụng

| CÂY TRỒNG | LIỀU LƯỢNG    | THỜI ĐIỂM PHUN |
|-----------|---------------|----------------|
| Dưa hấu   | 0,75 lít / ha | 20 - 30 ngày   |
| Cà chua   | 1 lít / ha    | 20 - 25 ngày   |

Lượng nước phun: 400 - 600 lít / ha.

Thời gian cách ly: Dưa hấu: 5 ngày. Cà chua: 7 ngày.

### Chú ý:

- Phun ướt đều tán cây trồng. Nếu áp lực bệnh cao phun lại lần hai cách nhau 5 - 7 ngày.
- Có thể pha trộn với thuốc trừ bệnh hoặc thuốc trừ sâu khác ngoại trừ thuốc có tính kiềm.

## Ý kiến nông dân

“ Từ khi phun Quintect, tình trạng cây dưa bị sương mai, rụng đầu thấy giảm hẳn, lá sạch bệnh, cứng chắc.

*Anh Nguyễn Quốc Trường*  
Nông dân tại Đức Huệ, Long An



“ Quintect giúp tôi tiết kiệm chi phí và số lần phun, hiệu quả rất tốt, giúp cây cà chua cho lá xanh, quả sáng đẹp, đều trái.

*Anh Vũ Quốc Tân*  
Nông dân tại Đơn Dương, Lâm Đồng



# Quintect<sup>10SC</sup>

Thuốc trừ bệnh

**BẢO VỆ TỐI ƯU - MÙA VỤ BỘI THU**  
**ĐẶC TRỊ SƯƠNG MAI**



**Công nghệ  
tiên tiến**



**Hiệu quả  
tức thời**



**Mùa màng  
bội thu**

### CÔNG TY TNHH FMC VIỆT NAM

Văn phòng đại diện: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3 868 9636 - Hotline tư vấn: 1900 88 66 47

Nhà máy: Số 12, lô B, Đường Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3 790 503 - Fax: (0274) 3 790 501

FMC Việt Nam



FMC Việt Nam



FMC Việt Nam





## Công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản

- **Quintect** chứa Picarbutrazox, là hoạt chất duy nhất của lớp hóa học mới Tetrazolyl oximes.
- Picarbutrazox có cơ chế tác động độc đáo nên không bị kháng chéo bởi các nấm đã kháng thuốc thuộc họ Oomycete nên **Quintect** là công cụ quản lý tính kháng rất hiệu quả.
- **Quintect** có tác động thấm sâu rất mạnh nên phòng và trị cực kỳ hiệu quả nhóm bệnh sương mai như Đốm phấn, Giả sương mai, Héo muộn ...



## Hiệu quả cao và tức thời

**Quintect** cô lập mầm bệnh ngay sau xử lý, nhanh chóng bảo vệ cây trồng.


- Ngay sau khi xử lý, những bào tử vừa nảy mầm trên bề mặt cây trồng sẽ bị tiêu diệt ngay, chúng không thể xâm nhập vào bên trong để gây bệnh.
- Nếu sợi nấm đã xâm nhập vào bên trong cây trồng, với tác động thấm sâu nhanh và mạnh, Quintect sẽ nhanh chóng tiếp cận và tiêu diệt các sợi nấm. Vì vậy, chúng không thể làm cho vết bệnh lớn hơn, không thể sinh sản và lan truyền bào tử.



**Quintect** 10SC



**Thuốc khác**



## Mùa màng bội thu

**Quintect** bảo vệ cây trồng tối ưu, cây sung, sạch bệnh giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản.



**Quintect** 10SC




**Thuốc khác**



## Thời điểm sử dụng trên dưa hấu

Bệnh thường xuất hiện từ 20 ngày sau trồng. Nên phun ngừa sớm ngay khi vừa nhiễm bệnh.

Vết bệnh mới nhiễm



## Thời điểm sử dụng trên cà chua

Bệnh thường xuất hiện gây hại nặng từ 25 - 65 ngày sau trồng. Nên phun phòng trị ngay khi phát hiện bệnh vừa mới nhiễm.

Vết bệnh điển hình

