

# AMICOR<sup>®</sup> Insecticide

SOUTH AFRICA Registration Number/Registrasie Nommer L10722, Act No. 36 of 1947/Wet 36 van 1947

READ THE LABEL BEFORE USE  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND ANIMALS

GROUP/GROEP	28	INSECTICIDES	INSEKDODERS
-------------	----	--------------	-------------

A suspension concentrate stomach and contact insecticide for the control of various insect pests on crops as listed.	'n Suspensie konsentraat maag en kontak insekdoder vir die beheer van verskeie plae op gewasse soos gelys.
--	--



#### HAZARD STATEMENTS:

Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

#### PRECAUTIONARY STATEMENTS:

Avoid release to the environment

Collect spillage

Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant

## WARNING

#### Active ingredient

Chlorantraniliprole (anthranilic diamide) – 200 g/L

#### Aktiewe bestanddeel

Chlorantranilipool (antraniliese diamied) – 200 g/L

Net Volume

200ml, 1L

Netto Volume

#### REGISTRATION HOLDER/REGISTRASIEHOUER:

FMC Chemicals (Pty) Ltd

Company Registration Number: 1988/001451/07

West End Office Park

Building C

Cnr West Ave & Hall Street

Centurion, 0014

Telephone number: +27 (76) 875 4432

[www.ag.fmc.com/za/en](http://www.ag.fmc.com/za/en)

Batch Number

Date of Manufacture

Expiry Date

Printed on Container

Printed on Container

2 Years from date of  
manufacture

Lot Nommer

Datum van Vervaardiging

Vervaldatum

UN Number/VN Nommer

3082

**For any emergency or poisoning contact: Griffon Poison Information  
Centre (24 hrs)  
Vir enige noodgeval of vergiftiging kontak Griffon vergiftiging  
Inligtingsentrum (24 hr)**

**+27-(0)-82-446-8946**

## WAARSKUWINGS:

### GEVAARSTELLING:

- Baie giftig vir waterlewe met langdurige effekte.

- **ONTHOUDINGSPERIODES:** Die volgende minimum aantal dae (onthoudingsperiode) moet verloop tussen laaste toediening en oes:

<b>Mielies &amp; Suikermielies</b>	<b>7 dae</b>
<b>Sorghum</b>	<b>21 dae</b>
<b>Sojabone</b>	<b>21 dae</b>

- Hanteer versigtig.
- Dit is onwaarskynlik dat hierdie produk skadelik sal wees wanneer ingeasem word of deur velkontak.
- Hierdie produk is giftig vir waterlewende ongewerwede diere.
- Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.
- Berg weg van voedsel en voer in die geslote, ge-etiketeerde oorspronklike houer by 'n temperatuur van nie hoër as 25°C nie.
- Die gebruik van hierdie produk anders as op die etiket aangedui kan aanleiding gee tot hoë residue of ander ongewenste resultate.
- **HERBETREDING:** Moet nie die behandelde gebied betree alvorens die spuitneerslag droog is nie.
- Optimale sistemiese werking van **AMICOR®** berus op translokasie van die aktiewe bestanddele in die behandelde plant. Daarom mag verlaagde effektiwiteit voorkom wanneer stresfaktore soos droogte translokasie belemmer.

### VRYWARING:

Alhoewel hierdie middel omvattend onder 'n groot verskeidenheid toestande getoets is, waarborg die registrasiehouer nie dat dit onder alle toestande doeltreffend sal wees nie, aangesien die werking en effek daarvan beïnvloed kan word deur faktore soos abnormale klimaats- en bergingstoestande; kwaliteit van verdunningswater; verenigbaarheid met ander stowwe wat nie op die etiket aangedui is nie en die voorkoms van weerstand van die plaag teen die betrokke middel sowel as die metode, tyd en akkuraatheid van toediening. Verder aanvaar die registrasiehouer nie verantwoordelikheid vir skade aan gewasse, plantegroei, en omgewing of vir nadelige effek op mens of dier of vir 'n gebrek aan prestasie van die betrokke middel as gevolg van die ontstaan van toestande wat nie kragtens die registrasie voorsien kon word nie. Raadpleeg die verskaffer in die geval van enige onsekerheid.

### VOORSORGMAATREËLS:

#### VOORSORGSTELLINGS:

- Vermy vrystelling na die omgewing
- Versamel gemorste produk
- Gooi inhoud/houer weg in 'n goedgekeurde herwinningsaanleg

### GEVAARLIKE BESTANDDELE:

Bevat reaksiemassa van 5-chloor-2-metiel-2H-isotiasool-3-on en 2-metiel-2H-isotiasool-3-een (3:1).  
Mag 'n allergiese reaksie veroorsaak.

- Moet nie spuitnewel inasem nie.
- Moet nie behandelde gebiede binnegaan alvorens die spuitstof afgedroog het nie.
- Alle persone in direkte kontak met die insekdoder moet beskermende klere dra (langmouhemp, langbroek, skoene met kouse en handskoene).
- Was uself na toediening van die produk.
- Was besoedelde klere na gebruik.
- Indien die produk in kontak kom met die oë, was onmiddellik met baie water.
- Indien ingeneem ontbied 'n geneesheer of kontak 'n vergiftigings sentrum.

- Moet nie eet, drink of rook tydens toediening of vermenging voordat hande en gesig gewas is nie.
- Voorkom besoedeling van voedsel, voer, eetgerei en drinkwater.
- **MOET NIE DIREK TOEDIEN OP, OF TOELAAT DAT ANDER GEWASSE ANDERS AS OP DIE ETIKET AANGEDUI, WEIDING, RIVIERE, DAMME OF GEBIEDE NIE ONDER BEHANDELING BESOEDEL WORD NIE.**
- Maak toediener skoon na gebruik en raak ontslae van waswater waar dit nie gewasse, weiding of water kan besoedel nie.
- \* **SPOEL LEË HOUER drie keer as volg:** keer die leë houer oor die spuit- of mengtenk om en dreineer vir minstens 30 sekondes nadat die vloeï tot 'n gedrup verminder het. Spoel daarna die leë houer *drie keer* na mekaar met een kwart van die houervolume vars water en giet die spoelwater in die spuittenk of mengtenk oor. Kap gate in die drie-keer gespoelde houer waarna dit aan 'n goedgekeurde versamelaar of verwerker oorhandig moet word ([www.croplife.co.za](http://www.croplife.co.za)). Moet nie die houer begrawe, verbrand of aan enige ander partye skenk wat dit as houer vir voedsel of drinkgoed mag gebruik nie.

### **NOODHULP MAATREËLS:**

#### ***Algemene advies:***

Moet nooit iets per mond aan 'n bewustelose persoon gee nie.

#### ***inaseming:***

Geen gevaar wat spesiale noodhulp vereis nie. Raadpleeg 'n dokter ná beduidende blootstelling.

#### ***Velkontak:***

Geen gevaar wat spesiale noodhulp vereis nie. As dit op die vel kom, spoel goed af met water. Was besoedelde klere voor hergebruik.

#### ***Oogkontak:***

Hou oog oop en spoel stadig en liggies met water vir 15-20 minute. Indien oog irritasie voortduur, raadpleeg 'n spesialis.

#### ***Inname:***

Geen gevaar wat spesiale noodhulp vereis nie. Raadpleeg 'n geneesheer indien nodig.

### **WEERSTAND VERKLARING:**

**AMICOR®** bevat chlorantranilipool, 'n groep 28 insekdoder, gebaseer op die internasionale IRAC \* Wyse van werking klassifikasie. Herhaaldelike en eksklusiewe gebruik van **AMICOR®** of ander Groep 28 Insekdoders kan weerstandbiedende insekbevolkings skep. Volg hierdie aanbevelings om die ontwikkeling van weerstand teen insekdoders soos **AMICOR®** te voorkom of te vertraag:

- Moet nie hoër dosisse van **AMICOR®** as die aanbeveel per seisoen vir enige gewas gebruik nie. Verwys na "Gebruiksaanwysings" vir die bepaalde riglyne per gewas.
  - Wend **AMICOR®** of ander Groep 28 insekdoders met behulp van 'n "venster" benadering toe om die blootstelling van verskeie opeenvolgende plaaggeslagte aan dieselfde wyse van werkings aksie te vermy. 'n Venster word gedefinieer as die tydperk van nawerking van insekdoders van dieselfde wyse van werking binne 'n geskatte 30 dae.
  - Twee opeenvolgende toedienings van **AMICOR®** kan binne 'n behandelingsvenster nuwe groei beskerm of hoë plaagbevolkings beheer.
  - Na 'n venster gebruik met **AMICOR®** of ander Groep 28 insekdoders wissel na 'n effektiewe insekdoder met 'n ander wyse van werking.
- Die tydperk tussen groep 28 behandelingsvensters behoort ten minste 60 dae te wees, beginnende van die laaste behandeling van groep 28 insekdoders.
- Inkorporeer IPM praktyke (kulturele en biologiese beheer) in die plaagbeheerprogram.
  - Monitor insekbevolkings vir die verlies van veld doeltreffendheid.
  - Teiken die mees sensitiewe lewenstadium van die plaag, gewoonlik jong larwes.
  - As probleme met beheer ervaar word, en weerstand is 'n redelike oorsaak, raadpleeg onmiddelik die plaaslike FMC verteenwoordiger of landboukundige adviseur vir die beste alternatiewe metode van beheer vir die area.

\* IRAC - Weerstand teen insekdoders Aksie Komitee. Vir meer inligting oor insekweerstand besoek die web by <http://www.irc-online.org>.

### **IPM EN ANDER VOORDELIGE NIE-TEIKEN INSEKTE:**

FMC ondersteun die gebruik van Geïntegreerde Plaagbeheer (IPM) programme om insekplae te beheer. Hierdie produk kan gebruik word as deel van 'n IPM program, wat kan insluit biologiese, kulturele en genetiese praktyke, gemik op die voorkoming van ekonomiese plaagskade. IPM beginsels en praktyke sluit in veld

verkenning of ander opsporing metodes, korrekte teiken plaag identifikasie, monitering van plaag bevolkings, rotasie van insekdoders met verskillende wyses van werking, en die behandeling van teiken plae wanneer hulle plaaslik bepaalde drempelwaardes bereik.

Chlorantraniliprole is 'n produk wat hoogs effektief is in die beheer van insekte en kan nadelige gevolge vir nie-teiken organismes en waterorganismes hê. Om skade te vermy, moet dit versigtig gebruik word in gebiede waar wenslike nie-teiken spesies teenwoordig mag wees.

Om te voldoen aan Goeie Landboupraktyke:

- Moet nie spuit wanneer bestuiwers aktief is nie.
- Moet nie naby of direk op water bespuit nie.
- Moenie toelaat dat die produk wegdryf van die teikengebied nie.

Lees en volg die etiket in sy geheel vir aanwysings oor die gebruik en bykomende voorsorgmaatreëls. Verstaan en implementeer Goeie Landboupraktyke tydens die gebruik van hierdie produk. Raadpleeg jou plaaslike Agent, Gewas Konsultant of FMC verteenwoordiger vir meer inligting oor Goeie Landboupraktyke.

Hierdie produk is giftig vir sywurms. Moenie toelaat dat die produk wegdryf na sywurm produksie areas of moerbeï boorde nie. Om skade te vermy, moet die produk versigtig gebruik word in gebiede waar wenslike nie-teiken spesies teenwoordig mag wees.

### **ALGEMENE INLIGTING:**

**AMICOR®** beskik oor 'n unieke werkingsmeganisme deur aan die ryanodien reseptore van insekte te bind en die bogenoemde reseptore te aktiveer. Hierdie aktivering stimuleer die loslating en uitputting van kalsium vanuit die interne stoorplekke van spiere, wat lei tot verswakke spier regulering, verlamming en die uiteindelijke dood van die insek. Dood van die plaag vind binne 2-3 dae plaas, maar inhibisie van insekbeweging en voeding vind vinnig plaas.

**AMICOR®** is aktief as 'n larfdoder deur inname (maagaksie) en deur kutikulêre absorpsie (kontakaksie).

**AMICOR®** beheer hoofsaaklik Lepidoptera insekplae, maar beheer ook sommige insekplae in ander Ordes bv. Coleoptera, Diptera ens.

### **REËNVASTHEID:**

**AMICOR®** het goeie reënvastheid wanneer blootgestel aan reën of sprinkelbesproeiing en die verwagte oorblywende aktiwiteit van die produk sal nie nadelig beïnvloed word nie.

### **BEPERKING VAN DIE WINDVERSPREIDING VAN SPUITNEWEL:**

Spesiale sorg moet toegepas word om die waai van spuitnewel buite die doelgebied te vermy, veral na damme, waterweë of slote. Die aanwending van groter druppels verminder wegdryf potensiaal, maar dit sal nie kontaminasie verhoed as toedienings onder ongunstige omgewingstoestande gemaak word nie. Dit is die verantwoordelikheid van die toediener om te bepaal of omgewingstoestande gunstig is vir 'n toediening sodat spuitnewel verspreiding deur wind nie sal plaasvind nie.

### **GEBRUIKSAANWYSINGS:**

### **GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI**

#### **VERENIGBAARHEID:**

Die tenkmengsel verenigbaarheid van **AMICOR®** is nog nie volledig ondersoek nie.

#### **MIELIES EN SUIKERMIELIES:**

**AMICOR®** is verenigbaar met:

**H & R Crop Oil (SUID AFRIKA Reg. Nr. L6802 Wet Nr. 36 of 1947),**  
*Raadpleeg die etiket van die bogenoemde produk vir volle besonderhede.*

Vir meer inligting aangaande verenigbaarheid kontak u naaste **FMC** verteenwoordiger.

Daar word aanbeveel dat gebruikers eers 'n klein hoeveelheid van die verlangde tenkmengsel met **AMICOR®** opmaak en kyk vir enige ongewensde veranderinge (afsaksels, vlokulasie, ens.). Vermy tenkmengsels met verskeie produkte.

## TENKMENGSEL VERMENGING:

Spuittoerusting moet skoon en vry van ander plaagdoder neerslae wees voor **AMICOR®** toegedien word. Maak die spuittenk  $\frac{1}{4}$  tot  $\frac{1}{2}$  vol met skoon water. Voeg die verlangde hoeveelheid **AMICOR®** direk in die spuittenk en vul op met water terwyl aanhoudend geroer word.

## TENKMENGSEL VOLGORDE:

Voeg verskillende formuleringstipes tot die mengsel soos hieronder aangedui. Laat tyd toe vir volledige vermenging en verspreiding na die byvoeging van elke produk.

1. Water oplosbare sak.
2. Water dispergeerbare korrels.
3. Benatbare poeiers.
4. **AMICOR®** en ander water-gebaseerde suspensie konsentrate.
5. Water-oplosbare konsentrate.
6. Olie gebaseerde suspensie konsentrate.
7. Emulgeerbare konsentrate.
8. Adjuvante, surfaktante, olies.
9. Oplosbare kunsmis.
10. Wegdryf vertragers.

\* Tensy anders vermeld deur die vervaardiger gebruiksaanwysings of deur plaaslike ervaring.

## GRONDTOEDIENING:

Dien **AMICOR®** as 'n volle dekbespuiting met konvensionele spuittoerusting toe, wat korrek gekalibreer is om deeglike bedekking van die teikengewas en die korrekte dosis per hektaar te verkry. In tamaties kan **AMICOR®** beide as 'n hoë volume volle dekbespuiting of as 'n verlaagde volume newelblaser toediening in minimum 500 liter spuitmengsel per hektaar toegedien word.

## LUGTOEDIENING:

Lugtoediening van **AMICOR®** mag slegs gedoen word deur 'n geregistreerde Lugbespuitings -operateur met 'n korrek gekalibreerde, geregistreerde vliegtuig volgens die instruksies van SANS 10118: 2009 (Aerial Application of Pesticides). Verseker dat die spuitmengsel eweredig oor die teikenarea versprei word en dat die verlies aan spuitmengsel tydens toediening tot 'n minimum beperk word. Dit is dus noodsaaklik om aan die volgende vereistes te voldoen:

- Volume: 'n Spuitmengsel volume van minstens 30 liter per hektaar word aanbeveel. Aangesien hierdie produk nie teen 'n verlaagde volume getoets is nie, kan die registrasiehouer nie effektiwiteit waarborg nie, of verantwoordelik gehou word vir enige nadelige effekte indien hierdie produk teen 'n laer volume toegedien word as hierbo aanbeveel.
- Druppelbedekking: 30 tot 40 druppels per  $\text{cm}^2$  moet op die teikenarea herwin word.
- Druppelgrootte: 'n Druppelspektrum met 'n VMD van 250 tot 280 mikron word aanbeveel. Beperk die produksie van druppels kleiner as 150 mikrons (hoë drywing en verdampingspotensiaal) tot 'n minimum.
- Vlieghoogte: Handhaaf die hoogte van die spuitbalk bo die teiken op 3 tot 4 meter. Moet nie spuit wanneer die vliegtuig duik of klim nie.
- Gebruik geskikte atomiseringsapparaat wat die vereiste druppelgrootte en bedekking sal produseer, maar wat die minste verlies van produk verseker. Die spuitstelsel moet 'n druppelspektrum met die kleinste moontlike Relatiewe Span produseer.
- Plaas al die atomiseerders in die binneste 60 tot 75% van die vlerkspan om te verhoed dat druppels binne-in die vlerkpuntvorteks in beweeg.
- Die verskil in temperatuur tussen die nat- en droëbol lesing, soos die van 'n swaaihigrometer, moet nie  $8^\circ\text{C}$  oorskry nie.
- Stop bespuiting indien die windspoed 15 km / h oorskry.
- Stop bespuiting tydens turbulente, onstabiele en droë toestande gedurende die hitte van die dag.
- Bespuiting onder temperatuur inversie toestande (deur bo of binne die inversie laag te spuit) en / of hoë lugvog toestande (relatiewe humiditeit 80% en meer) mag tot die volgende lei:

- Verlaagde effektiwiteit as gevolg van die suspensie en verdamping van klein druppels in die lug (Onvoldoende bedekking op teiken).
- Skade aan sensitiewe gewasse en / of nie-teiken areas as gevolg van wegdrywing van die spuitwolk vanaf die teiken area.

- Maak seker dat die Lugbespuitingsoperateur presies weet watter lande bespuit moet word. Verkry 'n versekering van die spuitoperateur dat aan die bogenoemde vereistes voldoen sal word en dat data van belang in 'n logboek saamgevat word vir toekomstige verwysing.

**MAKSIMUM RESIDUVLAKKE:**

Maksimum residuvlakke (MRL) en toleransies vir die Invoer van gewasse behandel met **AMICOR®** kan dalk nog nie bepaal wees in sommige lande nie. Raadpleeg jou uitvoerder of plaaslike verspreider voor die toediening van **AMICOR®** op gewasse wat vir uitvoer bestem is.

GEWAS/PES	TOEDIENINGS HOEVEELHEID	AANBEVELINGS/OPMERKINGS
<p><b>MIELIES &amp; SUIKERMIELIES:</b></p> <p>Afrika Bollwurm (larwes) <i>Helicoverpa armigera</i></p> <p>Mielie stronkboorders (larwes) <i>Busseola fusca</i>, <i>Chilo partellus</i></p> <p>Herfs kommandowurm (larwes) (<i>Spodoptera frugiperda</i>)</p>	<p><b>BLAARBESPUITING (GROND):</b></p> <p>150 ml/ha</p>	<p>Dien <b>AMICOR®</b> in 'n volume van 450 L water per hektaar toe.</p> <p><b>VIR HERFS KOMMANDOWURM:</b> Begin toedienings by die eerste teken van infestasië en skade wanneer wurms (larwes) kleiner as 1 cm in 5% van die plante gevind word. <b>Toedienings word nie aanbeveel vir die beheer van wurms (larwes) groter as 1 cm nie.</b></p> <p><b>VIR AFRIKA BOLWURM &amp; MIELIE STRONKBOORDERS:</b> Vir die beste gewasbeskerming dien toe tydens eierleggings fase totdat die eerste eiers uitbroei maar nie later as wanneer 5% van die plante skade toon nie. Dien toe oor die kelk van die plante en verseker behoorlike bedekking van die blare.</p> <p>Gebruik 14 dae intervalle tussen behandelings.</p> <p>Moet nie meer as 2 <b>AMICOR®</b> toedienings per seisoen maak nie.</p> <p>Die afwisseling van <b>AMICOR®</b> met produkte met 'n ander wyse van werking (bv <b>STEWART® 150 EC</b>) word aanbeveel.</p> <p>Die byvoeging van 'n geskikte geregistreerde benatter soos H &amp; R Crop Oil teen geregistreerde dosisse, mag die effektiwiteit van <b>AMICOR®</b> verbeter.</p> <p>Laat 7 dae toe tussen laaste <b>AMICOR®</b> toediening en oes.</p>
<p><b>MIELIES &amp; SUIKERMIELIES: (vervolg)</b></p> <p>Afrika Bollwurm (larwes) <i>Helicoverpa armigera</i></p> <p>Mielie stronkboorders (larwes) <i>Busseola fusca</i>, <i>Chilo partellus</i></p> <p>Herfs kommandowurm (larwes) (<i>Spodoptera frugiperda</i>)</p>	<p><b>GROND TOEDIENING OOR DIE PLANTRY:</b></p> <p>1.5 ml/100m plantry</p>	<p>Dien <b>AMICOR®</b> toe in 3L water per 100m plantry.</p> <p><b>VIR HERFS KOMMANDOWURM:</b> Begin toedienings by die eerste teken van infestasië en skade wanneer wurms (larwes) kleiner as 1 cm in 5% van die plante gevind word. <b>Toedienings word nie aanbeveel vir die beheer van wurms (larwes) groter as 1 cm nie.</b></p> <p><b>VIR AFRIKA BOLWURM &amp; MIELIE STRONKBOORDERS:</b> Vir die beste gewasbeskerming dien toe tydens eierleggings fase totdat die eerste eiers uitbroei maar nie later as wanneer 5% van die plante skade toon nie. Dien toe oor die kelk van die plante en verseker behoorlike bedekking van die blare.</p> <p>Gebruik 14 dae intervalle tussen behandelings as herinfestasië plaasvind.</p> <p>Moet nie meer as 2 <b>AMICOR®</b> toedienings per seisoen maak nie.</p> <p>Die afwisseling van <b>AMICOR®</b> met produkte met 'n ander wyse van werking (bv <b>STEWART® 150 EC</b>) word aanbeveel.</p> <p>Die byvoeging van 'n geskikte geregistreerde benatter soos H &amp; R Crop Oil teen geregistreerde dosisse, mag die effektiwiteit van <b>AMICOR®</b> verbeter.</p> <p>Laat 7 dae toe tussen laaste <b>AMICOR®</b> toediening en oes.</p>

<p><b>MIELIES &amp; SUIKERMIELIES: (vervolg)</b></p> <p>Afrika Bollwurm (larwes) <i>Helicoverpa armigera</i></p> <p>Mielie stronkboorders (larwes) <i>Busseola fusca</i>, <i>Chilo partellus</i></p> <p>Herfs kommandowurm (larwes) (<i>Spodoptera frugiperda</i>)</p>	<p><b>LUGBESPUITING:</b></p> <p>150 ml/ha</p>	<p>Dien <b>AMICOR®</b> in 'n volume van 30 L water per hektaar toe.</p> <p><b>VIR HERFS KOMMANDOWURM:</b> Begin toedienings by die eerste teken van infestasië en skade wanneer wurms (larwes) kleiner as 1 cm in 5% van die plante gevind word. <b>Toedienings word nie aanbeveel vir die beheer van wurms (larwes) groter as 1 cm nie.</b></p> <p><b>VIR AFRIKA BOLWURM &amp; MIELIE STRONKBOORDERS:</b> Vir die beste gewasbeskerming dien toe tydens eierleggings fase totdat die eerste eiers uitbroei maar nie later as wanneer 5% van die plante skade toon nie. Dien toe oor die kelk van die plante en verseker behoorlike bedekking van die blare.</p> <p>Gebruik 14 dae intervalle tussen behandelings. Moet nie meer as 2 <b>AMICOR®</b> toedienings per seisoen maak nie.</p> <p>Die afwisseling van <b>AMICOR®</b> met produkte met 'n ander wyse van werking (bv <b>STEWARD® 150 EC</b>) word aanbeveel.</p> <p>Die byvoeging van 'n geskikte geregistreerde benatter soos H &amp; R Crop Oil teen geregistreerde dosisse, mag die effektiwiteit van <b>AMICOR®</b> verbeter.</p> <p>Laat 7 dae toe tussen laaste <b>AMICOR®</b> toediening en oes.</p>
<p><b>MIELIES &amp; SUIKERMIELIES: (vervolg)</b></p> <p>Afrika Bollwurm (larwes) <i>Helicoverpa armigera</i></p> <p>Mielie stronkboorders (larwes) <i>Busseola fusca</i>, <i>Chilo partellus</i></p> <p>Herfs kommandowurm (Larwes) (<i>Spodoptera frugiperda</i>)</p>	<p><b>SPILPUNT-BESPUITING:</b></p> <p>150 ml/ha</p>	<p><b>VIR HERFS KOMMANDOWURM:</b> Begin toedienings by die eerste teken van infestasië en skade wanneer wurms (larwes) kleiner as 1 cm in 5% van die plante gevind word. <b>Toedienings word nie aanbeveel vir die beheer van wurms (larwes) groter as 1 cm nie.</b></p> <p><b>VIR AFRIKA BOLWURM &amp; MIELIE STRONKBOORDERS:</b> Vir die beste gewasbeskerming dien toe tydens eierleggings fase totdat die eerste eiers uitbroei maar nie later as wanneer 5% van die plante skade toon nie. Dien toe oor die kelk van die plante en verseker behoorlike bedekking van die blare.</p> <p><b>Maak seker dat die spilpuntbesproeiingstelsel aan die volgende spesifikasies voldoen alvorens toediening begin:</b></p> <p>Die distribusie koeffisiënt van die spilpunt-besproeiingstelsel moet &gt;90 % wees, en die spilpunt moet nie meer as 5 mm (50 000 l) per hektaar teen maksimum spoed, toedien nie.</p> <p>Maak alle siwwe van die spilpuntbesproeiing-stelsel skoon voor toediening 'n aanvang neem. Kalibreer die inspuitingpomp van die spilpunt-besproeiingstelsel volgens die tyd wat dit vir die spilpuntbesproeiingstelsel neem om een sirkel te voltooi.</p> <p>Stel die spilpuntbesproeiingstelsel op maksimum spoed sodat so min water as moontlik (nie meer as 5 mm nie) per hektaar toegedien word.</p> <p>Meng die <b>AMICOR®</b> met water in die toedieningstenk. Roer die spuitmengsel aanhoudend voor en tydens toediening. Spuit die <b>AMICOR®</b> spuitmengsel in die hoof toevoerlyn van die spilpuntbesproeiing- stelsel in sodra die besproeiingstelsel maksimum spoed bereik het. Merk die posisie in die land wanneer die spuitmengsel die verste punt van die spilpuntbesproeiingstelsel bereik het.</p> <p>Laat die spilpuntbesproeiingstelsel 'n volle sirkel vanaf laasgenoemde punt voltooi.</p> <p>Onder toestande van herhaaldelike infestasië, dien <b>AMICOR®</b> in 'n 14 dae spuitprogram toe. Moet nie die maksimum van 2 <b>AMICOR®</b> toedienings per seisoen oorskry nie. Wissel <b>AMICOR®</b> af met produkte met 'n ander wyse van werking (bv. <b>STEWARD® 150 EC</b>)</p> <p><b>Wanneer deur 'n spilpunt- besproeiingstelsel toegedien</b></p>

		word is dit nie nodig om 'n byvoegmiddel saam toe te dien nie. Indien 'n byvoegmiddel egter wel saam toegedien word, word 'n minerale olie tipe benatter soos bv. H&R Crop Oil teen 5 l per hektaar aanbeveel.
--	--	--

**BELANGRIKE NOTAS VAN TOEPASSING OP STRONK - & STAMBOORDER, AFRIKA BOLWURM EN HERFS KOMMANDOWURM MET AMICOR® IN MIELIES:**

LW: Moet nie **AMICOR®** toedien op mielies wat onder droogte spanning is nie.

Om optimum resultate te verseker, moet toediening vroeg in die oggend plaasvind wanneer dou teenwoordig is.

Larwes wat reeds in die kelke ingegrawe is, word nie deur **AMICOR®** beheer nie.

Moenie 2 toedienings per seisoen met **AMICOR®** oorskry nie. Twee toedienings kan opeenvolgend gemaak word, waarna oorgeskakel moet word na 'n insekdoder met 'n ander wyse van werking.

**Stronkboorder (*Busseola fusca*) larwes:**

**Kommersiële mielies:**

Dien toe tydens eierleggings fase totdat die eerste eiers uitbroei, maar nie later as wanneer 5% van die plante skade toon wat deur klein voedende larwes veroorsaak word nie.

**Suikermielies:**

Dien toe wanneer eierleggings fase begin, of met die eerste tekens van skade op die kelke.

**LW: Toediening moet gedoen word voordat larwes na die stingels van die mielieplante migreer en wanneer larwes kleiner is as die 2de instar larwe. Moet nie AMICOR® toedien op mielies teen stronkboorder wanneer die baard deur die vlagblaar omring word nie.**

**Sorghum stam boorder (*Chilo partellus*) larwes:**

**Kommersiële mielies:**

Dien toe wanneer eiers op 2,5% van die plante aangetref word, of wanneer 5% van die plante skade op die mieliekelke toon wat deur klein voedende larwes veroorsaak word.

**Suikermielies:**

Dien toe wanneer eierlegging begin of met die eerste tekens van skade op die mieliekelke.

**LW: Toediening moet gedoen word voordat larwes na die stingels van die mielieplante migreer en wanneer larwes kleiner is as die 2de instar larwe. Moet nie AMICOR® toedien op mielies teen stronkboorder wanneer die baard deur die vlagblaar omring word nie.**

**Afrika bolwurm (*Helicoverpa armigera*) larwes:**

**Kelk besmetting:**

Dien toe soos vir stronkboorder (sien aantekeninge hierbo).

**Mieliekop besmetting:**

Dien toe wanneer die eerste larwes op die baard waargeneem word tydens die vorming van die kop. Larwes wat reeds diep in die baard is of in die koppe ingemigreer het, sal nie beheer word nie.

**Herfs Kommandowurm (*Spodoptera frugiperda*) larwes:**

Dien toe aan die begin van die besmetting en by die eerste tekens van skade, wanneer 5% van die plante skade toon. Toedienings word NIE aanbeveel vir die beheer van wurms (larwes) groter as 1 cm nie.

LW: Toediening moet gedoen word voordat larwes in die koppe van die mielieplante inmigreer. Larwes wat reeds diep in die baard is of in die koppe in gemigreer het, sal nie beheer word nie.



<p><b>SORGHUM:</b></p> <p>Mielie stronkboorders (larwes) <i>Busseola fusca</i>, <i>Chilo partellus</i></p> <p>Herfs kommandowurm (Larwes) (<i>Spodoptera frugiperda</i>)</p>	<p><b>BLAARBESPUITING (GROND):</b></p> <p>150 ml/ha</p>	<p>Dien <b>AMICOR®</b> in 'n volume van 250-400 L water per hektaar toe.</p> <p><b>VIR HERFS KOMMANDOWURM:</b> Begin toedienings by die eerste teken van infestasië en skade wanneer wurms (larwes) kleiner as 1 cm in 5% van die plante gevind word. <b>Toedienings word nie aanbeveel vir die beheer van wurms (larwes) groter as 1 cm nie.</b></p> <p><b>VIR AFRIKA BOLWURM &amp; MIELIE STRONKBOORDERS:</b> Vir die beste gewasbeskerming dien toe tydens eierleggings fase totdat die eerste eiers uitbroei maar nie later as wanneer 5% van die plante skade toon nie. Verseker behoorlike bedekking van die blare.</p> <p>Gebruik 7 dae intervalle tussen behandelings.</p> <p>Moet nie meer as 2 <b>AMICOR®</b> toedienings per seisoen maak nie.</p> <p>Die afwisseling van <b>AMICOR®</b> met produkte met 'n ander wyse van werking (bv <b>STEWARD® 150 EC</b>) word aanbeveel.</p> <p>Die gebruik van 'n geskikte, geregistreerde adjuvant teen die geregistreerde dosis mag effektiwiteit verbeter.</p> <p>Laat 21 dae toe tussen laaste <b>AMICOR®</b> toediening en oes.</p>
<p><b>SORGHUM: (vervolg)</b></p> <p>Mielie stronkboorders (larwes) <i>Busseola fusca</i>, <i>Chilo partellus</i></p> <p>Herfs kommandowurm (Larwes) (<i>Spodoptera frugiperda</i>)</p>	<p><b>LUGBESPUITING:</b></p> <p>150 ml/ha</p>	<p>Dien <b>AMICOR®</b> in 'n volume van 30 L water per hektaar toe.</p> <p><b>VIR HERFS KOMMANDOWURM:</b> Begin toedienings by die eerste teken van infestasië en skade wanneer wurms (larwes) kleiner as 1 cm in 5% van die plante gevind word. <b>Toedienings word nie aanbeveel vir die beheer van wurms (larwes) groter as 1 cm nie.</b></p> <p><b>VIR AFRIKA BOLWURM &amp; MIELIE STRONKBOORDERS:</b> Vir die beste gewasbeskerming dien toe tydens eierleggings fase totdat die eerste eiers uitbroei maar nie later as wanneer 5% van die plante skade toon nie. Verseker behoorlike bedekking van die blare.</p> <p>Gebruik 7 dae intervalle tussen behandelings.</p> <p>Moet nie meer as 2 <b>AMICOR®</b> toedienings per seisoen maak nie.</p> <p>Die afwisseling van <b>AMICOR®</b> met produkte met 'n ander wyse van werking (bv <b>STEWARD® 150 EC</b>) word aanbeveel.</p> <p>Die gebruik van 'n geskikte, geregistreerde adjuvant teen die geregistreerde dosis mag effektiwiteit verbeter.</p> <p>Laat 21 dae toe tussen laaste <b>AMICOR®</b> toediening en oes.</p>

<p><b>SORGHUM: (vervolg)</b></p> <p>Mielie stronkboorders (larwes) <i>Busseola fusca</i>, <i>Chilo partellus</i></p> <p>Herfs kommandowurm (Larwes) (<i>Spodoptera frugiperda</i>)</p>	<p><b>SPILPUNT- BESPUITING:</b></p> <p>150 ml/ha</p>	<p><b>VIR HERFS KOMMANDOWURM:</b> Begin toedienings by die eerste teken van infestasië en skade wanneer wurms (larwes) kleiner as 1 cm in 5% van die plante gevind word. <b>Toedienings word nie aanbeveel vir die beheer van wurms (larwes) groter as 1 cm nie.</b></p> <p><b>VIR AFRIKA BOLWURM &amp; MIELIE STRONKBOORDERS:</b> Vir die beste gewasbeskerming dien toe tydens eierleggings fase totdat die eerste eiers uitbroei maar nie later as wanneer 5% van die plante skade toon nie. Verseker behoorlike bedekking van die blare.</p> <p><b>Maak seker dat die spilpuntbesproeiingstelsel aan die volgende spesifikasies voldoen alvorens toediening begin:</b></p> <p>Die distribusie koëffisiënt van die spilpunt-besproeiingstelsel moet &gt;90 % wees, en die spilpunt moet nie meer as 5 mm (50 000 l) per hektaar teen maksimum spoed, toedien nie. Maak alle siwwe van die spilpuntbesproeiing-stelsel skoon voor toediening 'n aanvang neem. Kalibreer die inspuitingpomp van die spilpunt-besproeiingstelsel volgens die tyd wat dit vir die spilpuntbesproeiingstelsel neem om een sirkel te voltooi.</p> <p>Stel die spilpuntbesproeiingstelsel op maksimum spoed sodat so min water as moontlik (nie meer as 5 mm nie) per hektaar toegedien word.</p> <p>Meng die <b>AMICOR®</b> met water in die toedieningstenk. Roer die spuitmengsel aanhoudend voor en tydens toediening.</p> <p>Spuite die <b>AMICOR®</b> spuitmengsel in die hoof toevoerlyn van die spilpuntbesproeiing- stelsel in sodra die besproeiingstelsel maksimum spoed bereik het. Merk die posisie in die land wanneer die spuitmengsel die verste punt van die spilpuntbesproeiingstelsel bereik het.</p> <p>Laat die spilpuntbesproeiingstelsel 'n volle sirkel vanaf laasgenoemde punt voltooi.</p> <p>Onder toestande van herhaaldelike infestasië, dien <b>AMICOR®</b> in 'n 7 dae spuitprogram toe. Moet nie die maksimum van 2 <b>AMICOR®</b> toedienings per seisoen oorskry nie. Wissel <b>AMICOR®</b> af met produkte met 'n ander wyse van werking (bv. <b>STEWART® 150 EC</b>)</p> <p>Wanneer <b>AMICOR®</b> deur die spilpunt toegedien word is die gebruik van 'n adjuvant onnodig. Indien 'n adjuvant wel toegedien word gebruik 'n minerale olie tipe soos H &amp; R Crop Oil teen geregistreerde toedienings dosisse en volg die voorgestelde tenkmengsel volgorde.</p> <p>Laat 21 dae toe tussen laaste <b>AMICOR®</b> toediening en oes.</p>
<p><b>SOJABONE:</b></p> <p>Afrika Bolwurm (larwes) <i>Helicoverpa armigera</i></p> <p>Plusia Valslandmeter <i>Chrysodeixis acuta</i></p>	<p><b>BLAARBESPUITING (GROND):</b></p> <p>150 ml/ha</p>	<p>Dien toe in 300-700 l water per hektaar vir sojabone. Verseker deeglike, eweredige bedekking van die blare. Dien <b>AMICOR®</b> toe tydens blom of wanneer die eerste bolwurm eiers of klein larwes waargeneem word tydens gereelde verkenning tydens blom- en peul-stadiums. 'n Opvolgbespuiting 7 dae later sal normaalweg nodig wees as die eerste toediening in die vroeë blomstadium gemaak word of onder herhaaldelike besmetting.</p> <p>Larwes wat die peule binnegedring het of deur digte blare weggesteek word tydens toediening, word nie voldoende beheer nie. Dit is dus noodsaaklik om deeglike bedekking van die blare te verseker.</p> <p>Die Spodoptera blaarwurm (<i>Spodoptera littoralis</i>) behoort ook in sojabone beheer te word indien dit tydens toediening teenwoordig is.</p> <p>Moenie 2 toedienings per seisoen in totaal van <b>AMICOR®</b> oorskry nie. Die afwisseling van <b>AMICOR®</b> met produkte wat 'n ander wyse van werking het (bv. <b>STEWART® 150 EC</b>) word aanbeveel.</p>

		<p>Die byvoeging van 'n geskikte geregistreerde byvoegmiddel teen die geregistreerde dosis kan die doeltreffendheid verhoog. Laat 21 dae toe tussen die laaste <b>AMICOR®</b> toediening en oes.</p>
--	--	--

## ERKENNING VAN GEREGISTREERDE PRODUKTE:

- H & R Crop Oil (**SUID AFRIKA** Reg. no L6802 van Wet 36 van 1947) is die geregistreerde produk van H & R South Africa Sales (Pty) Ltd
- Break-Thru (**SUID AFRIKA** Reg. no L6764 van Wet 36 van 1947) is die geregistreerde produk van Evonik Degussa Africa (Pty) Ltd
- Entrée (**SUID AFRIKA** Reg. no L8055 van Wet 36 van 1947) is die geregistreerde produk van Miller Chemicals SA (Pty) Ltd
- Dithane™ M-45 800 WP NT (**SUID AFRIKA** Reg. Nr. L7484, Wet Nr. 36 of 1947; **NAMIBIË** Reg. Nr. N-AR 1043, Wet Nr. 36 of 1947) is die geregistreerde produk van Dow Agrosiences.
- Villa 51 (**SUID AFRIKA** Reg. no L8050 van Wet 36 van 1947) is die geregistreerde produk van Villa Crop Protection (Pty) Ltd
- Tanos® (**SUID AFRIKA** Reg. No. L6564 Act No. 36 of 1947) is die geregistreerde produk van DuPont de Nemours (Pty) Ltd